

Tabuľka 1. Systematický prehľad dvojkridlovcov (Diptera) zistených v PR Šúr. V prvom stĺpci sú poznámky a odkazy na literárne údaje, v zostávajúcich stĺpcoch sú údaje (mesiac zberu a počtu zistených jedincov) o druhoch zistených na lokalitách v PR Šúr metódou zberu do Malaisého pascí v roku 2008.

Table 1. Systematic survey of the flies species (Diptera) recorded in NR Šúr (west-south Slovakia). In first column are notes and references on literature data, in remaining columns are data (month of collection and number of individuals) about species found on localities in NR Šúr by method of Malaise traps in the year 2008.

Čeľaď/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
Trichoceeridae						
<i>Trichocera</i> (s.str.) <i>regelationis</i> (Linnaeus, 1758)				3/3, 4/3,		
Limoniidae						
<i>Austrolimnophila</i> (s.str.) <i>ochracea</i> (Meigen, 1804)					6/47, 4/4,	
<i>Dactyolabis</i> (s.str.) <i>transversa</i> (Meigen, 1804)						
<i>Dicranomyia</i> (s.str.) <i>chorea</i> (Meigen, 1818)			5/1,			
<i>Dicranomyia</i> (s.str.) <i>dichoma</i> (Meigen, 1804)	5/1,			5/1,	4/1, 5/1, 10/5, 8/8, 10/1,	6/2,
<i>Dicranomyia</i> (s.str.) <i>ornata</i> (Meigen, 1818)	8/1,				8/9,	6/2, 7/1,
<i>Dicranopycha fuscescens</i> (Schummel, 1829)	5/9,		5/19, 6/2, 7/2	5/9, 6/5,	4/1, 5/15, 6/1, 10/1 6/2,	5/13, 6/4,
<i>Discobola annulata</i> (Linnaeus, 1758)						
<i>Discobola caesarea</i> (Osten Sacken, 1854)			4/2,		4/1, 5/9, 7/1, 8/1,	6/2,
<i>Eleophila maculata</i> (Meigen, 1804)			5/2,			
<i>Epiphragma</i> (s.str.) <i>ocellare</i> (Linnaeus, 1761)						
<i>Gonomyia</i> (s.str.) <i>lucidula</i> de Meijere, 1920						
<i>Haplolabis (Parilisia) areolata</i> (Siebke, 1873)					7/5, 8/1,	
<i>Idioptera pulchella</i> (Meigen, 1830)			4/1,		5/1, 10/3, 8/1,	
<i>Ilisia maculata</i> (Meigen, 1804)						
<i>Limnophila</i> (s.str.) <i>pictipennis</i> (Meigen, 1818)	6/3, 7/2, 8/1, 9/10, 10/7, 11/10,		8/5, 10/5, 11/7,	6/1, 8/1, 10/5,	5/3, 6/10, 7/45, 8/26, 10/5,	6/5, 7/16, 8/10, 9/5, 10/3,
<i>Limonia flavipes</i> (Fabricius, 1787)						
<i>Limonia macrostigma</i> (Schummel, 1829)	4/43, 6/5,		4/2, 5/68, 6/6,	7/2, 4/9, 5/26, 6/28, 7/1,	4/3, 5/162, 6/20, 8/2, 10/1, 11/5, 11/1,	5/21, 6/23, 8/2, 8/1,
<i>Limonia nigropunctata</i> (Schummel, 1829)						
<i>Limonia nubeculosa</i> Meigen, 1804						
<i>Limonia stigma</i> (Meigen, 1818)						

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Lipsothrix errans</i> (Walker, 1848)					5/9, 6/2,	
<i>Metalmobbia quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1761)	11/1,				4/1, 5/2, 8/1,	6/3, 8/1,
<i>Molophilus flavus</i> Goetghebuer, 1920					6/2,	
<i>Molophilus ochraceus</i> (Meigen, 1818)			5/1,		5/2,	5/1,
<i>Pilaria decolor</i> (Zetterstedt, 1851)			5/1,			
<i>Rhipidia maculata</i> Meigen, 1818	5/5,		5/2, 8/1,	5/6,	5/3, 6/1, 8/1,	5/3,
<i>Rhypholophus haemorrhoidalis</i> (Zetterstedt, 1838)					4/4, 10/8, 11/5,	
Pediciidae						
<i>Tricyphona immaculata</i> (Meigen, 1804)			4/1,	10/2,		
Tipulidae						
<i>Ctenophora</i> (s.str.) <i>elegans</i> Wiedemann, 1818				8/2,	8/1,	
<i>Dictenidia bimaculata</i> (Linnaeus, 1761)			8/1,			
<i>Tanyptera atrata</i> (Linnaeus, 1758)	5/4,		4/1, 5/14, 6/1	5/8, 6/1,	4/2, 5/31,	5/1,
<i>Tipula</i> (<i>Yamatotipula</i>) <i>couckeii</i> Tonnoir, 1921	4/1,		6/6,	6/3,	6/6,	6/19, 7/2,
<i>Tipula</i> (<i>Vestiptex</i>) <i>excisa</i> Schummel, 1833	6/3,				5/1,	
<i>Tipula</i> (<i>Lunatipula</i>) <i>fascipennis</i> Meigen, 1818						
<i>Tipula</i> (<i>Savitshenkia</i>) <i>limbata</i> Zetterstedt, 1838						
<i>Tipula</i> (<i>Acutipula</i>) <i>luna</i> Westhoff, 1879				7/1,		
<i>Tipula</i> (<i>Lunatipula</i>) <i>lunata</i> Linnaeus, 1758	5/3,		5/5,	5/4, 6/2,	5/12,	5/11, 6/15,
<i>Tipula</i> (<i>Nigrotipula</i>) <i>nigra</i> Linnaeus, 1758	11/1,				7/5, 8/21, 10/2,	
<i>Tipula</i> (<i>Vestiptex</i>) <i>nubeculosa</i> Meigen, 1804	5/2,		5/1,			5/2,
<i>Tipula</i> (s.str.) <i>oleracea</i> (Linnaeus, 1758)			5/76,	5/1,	5/1, 9/2, 10/1,	
<i>Tipula</i> (s.str.) <i>orientalis</i> Lackschewitz, 1930	9/2,		10/1, 11/12,	9/1,	8/1, 10/4,	5/6, 9/2,
<i>Tipula</i> (s.str.) <i>paludosa</i> Meigen, 1830			6/6, 8/1,			
			10/3, 11/5,			
	5/15, 6/4, 8/1,		5/27, 6/4,	5/42, 6/12,	5/7, 6/49, 7/8,	5/6, 6/20,
<i>Tipula</i> (<i>Yamatotipula</i>) <i>pruinosa</i> Wiedemann, 1817			7/6, 8/2,	7/25, 8/2,	8/2, 11/1,	7/5,
	8/1,		11/7,		10/1,	8/1,
<i>Tipula</i> (<i>Vestiptex</i>) <i>scripta</i> Meigen, 1830						10/1,
<i>Tipula</i> (<i>Savitshenkia</i>) <i>signata</i> Staeger, 1840	6/2,		6/1,	5/2, 6/1,		5/1,
<i>Tipula</i> (<i>Pterelachisus</i>) <i>submarmorata</i> Schummel, 1833				5/3,	4/4, 5/54,	6/1,
<i>Tipula</i> (<i>Lunatipula</i>) <i>truncata</i> Loew, 1873			5/2,			
<i>Tipula</i> (<i>Pterelachisus</i>) <i>varipennis</i> Meigen, 1818						
<i>Tipula</i> (<i>Lunatipula</i>) <i>vernalis</i> Meigen, 1804						
Bibionidae						
<i>Biblio clavipes</i> Meigen, 1818	4/1,		4/102,	4/75,	4/6,	
<i>Biblio femoralis</i> Meigen, 1838						

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Bibio fulvipes</i> (Zettersteet, 1838)			4/103,	5/4,		
<i>Bibio hortulanus</i> (Linnaeus, 1758)		4/1,			5/3,	
<i>Bibio johannis</i> (Linnaeus, 1767)		4/5, 5/1, 6/1,	4/4,	4/1,	4/1, 5/1,	5/2,
<i>Bibio marci</i> (Linnaeus, 1758)		4/1, 8/1, 9/3,		5/1,	5/2, 8/1, 9/3,	5/1, 6/1, 8/1
<i>Dilophus febrilis</i> (Linnaeus, 1758)						
Diadocidiidae						
<i>Diadocidia</i> (s. str.) <i>ferruginosa</i> (Meigen, 1830)					5/1,	
Ditomyiidae						
<i>Ditomyia fasciata</i> (Meigen, 1818)					4/1,	6/1,
<i>Symmeris annulatus</i> (Meigen, 1830)				6/1, 9/1, 10/1,		
Keroplastidae						
<i>Keroplastus testaceus</i> (Dalman, 1818)				6/1, 9/2,	8/2,	
<i>Neoplaturya flava</i> (Macquart, 1826)				8/5,		6/1,
<i>Macrocera centralis</i> Meigen, 1818		5/3,	5/2, 6/2, 7/6,	5/12, 7/6, 8/3,	8/1,	
<i>Macrocera fasciata</i> Meigen, 1804		10/1, 11/1,		8/1, 11/1,		5/1,
<i>Macrocera phalerata</i> Meigen, 1818		10/1,				
<i>Orfelia nemoralis</i> (Meigen, 1818)		5/2, 6/6,	5/48,		6/3,	5/15, 6/2,
<i>Orfelia pallida</i> (Staeger, 1804)			5/2,	10/1,		
<i>Platyrura marginata</i> Meigen, 1804						
Mycetophilidae						
<i>Acnemia nitidicollis</i> (Meigen, 1818)		6/1,	6/2,			
<i>Boletina nigricoxa</i> Staeger, 1840	I. nález v SR!	3/31,			10/3, 11/52,	
<i>Boletina sciarina</i> Staeger, 1840		11/15,	10/12,		5/2,	
<i>Coelosia flava</i> (Staeger, 1840)	I. nález v SR!			5/1,		
<i>Docosia flavicoxa</i> Strobl, 1900				10/1,	10/10,	
<i>Docosotoma fuscicornis</i> (Meigen, 1818)		4/2, 5/131, 6/4,	4/3, 5/77,	3/13, 4/13,	5/16, 6/5, 7/3,	5/2, 6/1,
<i>Epicrypta scatophora</i> (Perris, 1849)			6/40, 7/5,	5/26, 6/6, 8/3,		7/4,
<i>Exechia fusca</i> (Meigen, 1804)		4/3,	3/53, 4/82,	3/270, 4/103,		7/6,
<i>Gnoriste bilineata</i> Zetterstedt, 1852		4/1,	6/4,	6/6,		
<i>Grzegorzekia collaris</i> (Meigen, 1818)				8/2,		
<i>Leia bimaculata</i> (Meigen, 1804)		8/3,	5/4, 7/2,	4/3, 7/2, 10/1,	11/10,	
<i>Leia fascipennis</i> Meigen, 1818				11/5,		
<i>Leia winthemi</i> Lehmann, 1822			5/2, 6/3,	5/1, 6/1, 8/1, 10/22	8/5,	8/4,
<i>Leptomorphus walkeri</i> Curtis, 1831			6/2,	5/1, 6/		

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Monoclonia rufilaterata</i> (Walker, 1837)		4/1, 10/5,	10/14, 11/13,	5/21, 8/9, 10/15, 11/1, 4/1, 9/1,	4/3, 6/1, 9/30,	7/14, 8/12,
<i>Mycetophila forcipata</i> Lundström, 1913		8/3, 11/10,		11/7,	11/5,	
<i>Mycetophila fungorum</i> (De Geer, 1776)		4/1, 9/30, 11/2, 10/25,	10/4, 11/18, 3/1, 5/1, 6/21, 7/15, 8/7, 11/19,	3/6, 6/1, 7/80, 8/30, 9/6, 10/16, 10/5,	4/1, 5/6, 6/3, 7/90, 8/10,	5/2, 6/10, 9/2, 10/4,
<i>Mycetophila uninotata</i> Zetterstedt, 1852				5/1, 9/3,	11/10,	6/1, 7/1, 8/2,
<i>Mycomya (Mycomyopsis) affinis</i> (Staeger, 1840)		6/1, 8/5, 11/1, 8/1,		5/2,	4/1,	
<i>Neoempheria lineola</i> (Meigen, 1818)		5/1,				
<i>Neuratelia nemoralis</i> (Meigen, 1818)		8/3, 9/10,	5/1, 5/1,	4/1, 5/21, 8/10, 11/5, 5/3,	4/1, 5/1,	5/2,
<i>Polytepta guttiventris</i> (Zetterstedt, 1852)						
<i>Sciophila lutea</i> Macquart, 1826		6/1,				5/1, 6/1,
<i>Synapha vitripennis</i> (Meigen, 1818)						
<i>Syntenna setigera</i> (Lundström, 1914)						
<i>Zygomyia notata</i> (Stannius, 1831)						
Sciaridae						
<i>Bradysia praecox</i> (Meigen, 1818)		4/2, 5/7,	5/21, 6/1,	5/201, 4/52,	5/4,	8/1,
<i>Bradysia reflexa</i> Tuomikoski, 1960				3/1, 5/42, 6/21, 10/30, 11/5, 4/3, 5/51, 5/2,	6/11, 7/21, 8/3, 10/3,	5/5,
<i>Bradysia tilicola</i> (Loew, 1850)		4/2, 5/22, 8/2005, 9/1800,	5/22, 11/10,	5/610, 8/200, 10/3,	5/2, 8/301, 9/110, 11/1, 6/3, 7/5, 6/4,	5/68, 7/1, 8/660, 9/60, 10/1, 6/4,
<i>Phytosciara (Dolichosciara) flavipes</i> (Meigen, 1804)				7/1,		
<i>Schwencfeldina carbonaria</i> (Meigen, 1830)		4/2, 5/1, 6/4, 11/3,	6/25, 8/20,	3/10, 4/30, 5/2, 6/14, 7/8, 8/350,	4/51, 6/1, 7/86, 8/1, 10/5,	5/22, 6/8,
<i>Sciara militaris</i> Nowicki, 1868						
<i>Sciara hemerobioides</i> (Scopoli, 1763)						
Cecidomyiidae						
<i>Acodiplosis inulae</i> (H. Loew, 1847)	Č. I.					
<i>Aspondylia ononidis</i> F. Löw, 1893	Č. I.					
<i>Bayeria capitigena</i> (Bremer, 1874)	Č. I.					
<i>Contarinia loti</i> (De Geer, 1776)	Č. I.					
<i>Contarinia quercina</i> (Rübsaamen, 1890)	Č. I.					8/2,

Čel'ad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Dasineura acerisrisans</i> (Kieffer, 1888)	Č.I.					
<i>Dasineura asperulae</i> F. Löw, 1875	Č.I.					
<i>Dasineura crataegi</i> (Winnertz, 1853)	Č.I.					
<i>Dasineura fraxinea</i> (Kieffer, 1907)	Č.I.					
<i>Dasineura plicatrix</i> (H. Loew, 1850)	Č.I.					
<i>Dasineura pyri</i> (Bouché, 1847)	Č.I.					
<i>Dasineura ranunculi</i> (Bremi, 1847)	Č.I.					
<i>Dasineura tortrix</i> (F.Löw, 1877)	Č.I.					
<i>Jaapiella loticola</i> (Rübsaamen, 1889)	Č.I.					
<i>Jaapiella schmidti</i> (Rübsaamen, 1912)	Č.I.					
<i>Jaapiella veronicae</i> (Vallois, 1827)	Č.I.					
<i>Janetia cerris</i> (Kollar, 1850)	Č.I.	4/1,				
<i>Janetia homocera</i> (F. Löw, 1877)	Č.I.					
<i>Janetia czepligetii</i> (Kieffer, 1896)	Č.I.					
<i>Lasioptera calamagrostis</i> Rübsaamen, 1893	Č.I.		6/5,			
<i>Lasioptera rubi</i> (Schränk, 1803)	Č.I.					
<i>Macrodiplosis dryobia</i> (F. Löw, 1877)	Č.I.					
<i>Macrolabis luceti</i> Kieffer, 1898	Č.I.					
<i>Mycodiplosis saundersi</i> Barnes, 1927	Č.I.					
<i>Ozirhincus millefolli</i> (Wachtl, 1884)	Č.I.					
<i>Ozirhincus tanacetii</i> (Kieffer, 1887)	Č.I.					
<i>Physemonecis ulmi</i> (Kieffer, 1914)	Č.I.	9/2,				
<i>Polystepha quercus</i> Kieffer, 1897	Č.I.					
<i>Rhabdophaga terminalis</i> (H. Loew, 1850)	Č.I.					
<i>Rhopalomyia tanaceticola</i> (Karsch, 1879)	Č.I.					
<i>Tricholaba trifolii</i> Rübsaamen, 1917	Č.I.					
<i>Wachtliella persicariae</i> (Linnaeus, 1767)	Č.I.					
<i>Wachtliella rosarum</i> (Hardy, 1840)	Č.I.					6/5,
Psychodidae						
<i>Clytocerus (Boreoclytocerus) rivosus</i> (Tonnoir, 1919)	10/5,					
<i>Jungiella</i> (s.str.) <i>soleata</i> (Walker, 1856)	4/1, 8/3, 10/3,			6/3,	7/410, 9/5,	
<i>Pneumia nubila</i> (Meigen, 1818)				7/1,	6/10,	
<i>Psycha griseocens</i> (Tonnoir, 1922)	11/1,		6/2,	8/1,	5/16, 6/82, 7/350,	6/1,
<i>Psychoda phalaenoides</i> (Linnaeus, 1758)			7/2,		8/1, 11/30	6/5,
<i>Psychodula minuta</i> (Banks, 1894)	6/1,			9/2,		

Čeľad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Tinearia alternata</i> (Say, 1824)			10/50,	8/1, 9/3, 11/2,	5/27, 7/20, 8/670, 9/30, 10/70,	6/5,
Anisopodidae						
<i>Sylvicola fenestralis</i> (Scopoli, 1763)						
<i>Sylvicola zetterstedti</i> (Edwards, 1923)						
Mycetobiidae						
<i>Mycetobia pallipes</i> Meigen, 1818	9/2, 5/1,		6/1, 7/1,	4/1, 6/1, 9/2, 11/2	5/1, 6/1,	6/2, 7/2,
Scatopsidae						
<i>Scatopse notata</i> (Linnaeus, 1758)	4/2, 11/2,		4/3, 11/2,	4/1,	10/5, 11/10,	
Ptychopteridae						
<i>Ptychoptera (Parapychoptera) lacustris</i> Meigen, 1830			5/1,			7/1, 8/1,
Culicidae						
<i>Anopheles claviger</i> (Meigen, 1804)	Č. I.					
<i>Anopheles maculipennis</i> Meigen, 1818	Č. I.	11/1,				
<i>Anopheles messeae</i> Falleroni, 1926	Č. I.					
<i>Culex pipiens pipiens</i> Linnaeus, 1758	Č. I.	8/2, 10/1, 11/2	10/1, 7/5,	6/1, 7/2, 9/3,	6/1, 7/2, 5/2,	6/1,
<i>Culiseta annulata</i> (Schränk, 1776)	Č. I.	9/6,	6/5, 4/106,		4/3,	6/1,
<i>Dahliana geniculata</i> (Olivier, 1791)	Č. I.		5/94, 6/12, 7/2, 8/2,	4/3, 5/39, 6/15, 7/6, 8/9, 10/12, 11/2,	4/1, 5/383, 6/9, 7/14, 8/5, 10/2, 9/2,	5/79, 6/6, 7/8, 8/15,
<i>Ochlerotatus</i> (s.str.) <i>annulipes</i> (Meigen, 1830)	Č. I.			4/4,		
<i>Ochlerotatus</i> (s.str.) <i>canitans</i> (Meigen, 1818)	Č. I.					
<i>Ochlerotatus</i> (s.str.) <i>cataphylla</i> Dyar, 1916	Č. I.	10/6,	4/203,		5/206,	6/2,
<i>Ochlerotatus</i> (s.str.) <i>communis</i> (De Geer, 1776)	Č. I.					
<i>Ochlerotatus</i> (s.str.) <i>dorsalis</i> (Meigen, 1830)	Č. I.					
<i>Ochlerotatus</i> (s.str.) <i>excrucians</i> (Walker, 1856)	Č. I.					
<i>Ochlerotatus</i> (s.str.) <i>flavescens</i> (Müller, 1764)	Č. I.					
<i>Ochlerotatus</i> (s.str.) <i>leucomelas</i> (Meigen, 1804)	Č. I.					
<i>Ochlerotatus</i> (s.str.) <i>pulcritarsis</i> (Rondani, 1872)	Č. I.					
Chironomidae						
<i>Chironomus</i> (s.str.) <i>plumosus</i> (Linnaeus, 1758)		4/30,	3/6, 4/6, 5/12, 8/5,	3/3, 4/2,	9/1, 10/2, 11/6,	8/22, 9/10, 10/1, 6/5, 7/11,
<i>Cryptochironomus defectus</i> (Kieffer, 1913)						
<i>Dicrotendipes nervosus</i> (Staeger, 1839)						
<i>Diptocladius cultriger</i> Kieffer, 1908		V.59	5/22,	5/6,	6/12,	
<i>Heterotrissocladus marcidus</i> (Walker, 1856)		4/1,				4/1200,

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Melitocnemus fuscipes</i> (Meigen, 1818)					4/880,	
<i>Psectrocladius</i> (s.str.) <i>sordidellus</i> (Zetterstedt, 1838)	4/105,					
<i>Psectrotanytus varius</i> (Fabricius, 1787)	4/1,					
<i>Zavrelimyia melanura</i> (Meigen, 1804)	8/3,	11/5,			5/196, 11/5	6/5, 7/15,
Ceratopogoniidae						
<i>Atrichopogon</i> (s.str.) <i>minutus</i> (Meigen, 1830)	10/5,					
<i>Culicoides (Oecacta) adibilis</i> Austen, 1921	Č I.					
<i>Culicoides (Oecacta) albicans</i> (Winnertz, 1852)	Č I.					
<i>Culicoides (Oecacta) fuscipennis</i> (Staeger, 1839)	Č I.			6/2,		
<i>Culicoides (Oecacta) pallidicornis</i> Kieffer, 1919	Č I.					
<i>Culicoides (Oecacta) pictipennis</i> (Staeger, 1839)	Č I.					
<i>Culicoides (Oecacta) simulator</i> Edwards, 1939	Č I.					
<i>Culicoides (Oecacta) vidourlensis</i> Callot, Kremer, Molet et Bach, 1968	Č I.			7/3,		7/3, 8/5,
<i>Culicoides</i> (s.str.) <i>pulicaris</i> (Linnaeus, 1758)	Č I.					
<i>Culicoides (Avaritita) obsoletus</i> (Meigen, 1818)	Č I.	9/2,				
<i>Culicoides (Avaritita) scoticus</i> Downes et Kettle, 1952	Č I.					
<i>Culicoides (Monoculicoides) nubeculosus</i> (Meigen, 1830)	Č I.			8/3,		
<i>Culicoides (Monoculicoides) riethi</i> Kieffer, 1914	Č I.					
<i>Culicoides (Beltrannymia) circumscriptus</i> Kieffer, 1918	Č I.					
<i>Culicoides (Beltrannymia) salinarius</i> Kieffer, 1914	Č I.					
<i>Dasyhelea</i> (s.str.) <i>dufourii</i> (Laboulbene, 1869)	10/5,					
<i>Serromyia atra</i> (Meigen, 1818)	8/4,	6/1,		7/2,		
Simuliidae						
<i>Neversmannia cryophilum</i> (Rubcov, 1956)		11/6,				
<i>Simulium</i> (s.str.) <i>ornatum</i> Meigen, 1818	4/1,					
<i>Simulium</i> (s.str.) <i>reptans</i> (Linnaeus, 1758)	8/1,	4/1, 5/5,				5/1, 6/2, 7/1, 8/4,
Xylophagidae						
<i>Xylophagus compeditus</i> Meigen, 1822	4/2,	4/2,	4/2, 5/3,		4/3, 5/9,	
Rhagionidae						
<i>Chrysopilus auratus</i> (Fabricius, 1805)					7/31, 8/1,	
<i>Chrysopilus nubecula</i> (Fallén, 1814)					7/16, 8/14,	6/5,
<i>Rhagio conspicuosus</i> Meigen, 1804						
<i>Rhagio latipennis</i> (Loew, 1856)		5/5,			5/8, 6/2,	6/9,
<i>Rhagio lineeola</i> Fabricius, 1794		5/1,			6/2,	

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Rhagio notatus</i> (Meigen, 1820)		5/1,	6/1,	5/3,	5/24, 6/3,	5/2, 6/5,
<i>Rhagio scolopaceus</i> (Linnaeus, 1758)					5/7,	5/1, 6/20, 8/1
<i>Rhagio tringarius</i> (Linnaeus, 1758)					7/11,	7/2,
<i>Symphoromyia</i> (s.str.) <i>melaena</i> (Meigen, 1820)					7/1,	
Tabanidae						
<i>Aylotus fulvus</i> (Meigen, 1820)	Č I.					
<i>Aylotus loewianus</i> (Villeneuve, 1920)	S-R 93					
<i>Aylotus rusticus</i> (Linnaeus, 1767)	Č I.					
<i>Chrysops caecutiens</i> (Linnaeus, 1758)	Č I.					
<i>Chrysops relictus</i> Meigen,	S-R 93		7/5,			
<i>Chrysops viduatus</i> (Fabricius,	S-R 93	8/3,	6/1, 8/2,	6/1, 7/9, 8/3,	6/8, 7/9, 8/4,	7/8, 8/1,
<i>Haematopota grandis</i> Meigen, 1820	Č I.					
<i>Haematopota pluvialis</i> (Linnaeus, 1758)	S-R 93	8/30,	5/1, 6/1, 7/2,	7/3, 8/6,	5/11, 6/13,	5/5, 6/4,
					7/120, 8/21,	7/24, 8/15,
<i>Haematopota subcylindrica</i> Pandellé,	S-R 93					
<i>Heptatoma pellucens</i> (Fabricius,	S-R 93					
<i>Hybomitra bimaculata</i> (Maequart,	S-R 93	8/3,		6/1, 7/6,	6/12,	
<i>Hybomitra ciureai</i> (Ségui, 1937)	S-R 93		5/1,	7/2,	7/25, 8/1,	
<i>Hybomitra distinguenda</i> (Verrall, 1909)	Č I.	5/5, 6/1,	5/13, 6/5,	5/7, 6/7, 7/8,	5/6, 6/28, 7/25, 8/1	5/2,
<i>Hybomitra lundbecki</i> Lyneborg, 1959	Č I.					6/2,
<i>Hybomitra muehlfeldi</i> (Brauer,	S-R 93		8/2,			
<i>Hybomitra tropica</i> (Linnaeus, 1758)	Č I.					
<i>Tabanus autumnalis</i> Linnaeus,	S-R 93				7/2,	
<i>Tabanus bovinus</i> Linnaeus, 1758		9/1,	5/1, 6/1, 8/1,	6/1, 7/2, 8/1,	7/10,	
<i>Tabanus bromius</i> Linnaeus, 1758	Č I., S-R 93	6/1, 8/3,	5/1, 8/2,	5/1, 6/7,	5/1, 6/7, 8/1,	6/1, 8/2,
<i>Tabanus cordiger</i> Meigen,	S-R 93			7/1,		
<i>Tabanus maculicornis</i> Zetterstedt,	S-R 93			7/1,	8/2,	6/3,
<i>Tabanus miki</i> Brauer, 1880			5/1,	6/1, 7/4,	6/1, 7/1, 8/1,	8/1,
<i>Tabanus sudeticus</i> Zeller,	S-R 93					
<i>Therioptectes gigas</i> (Herbst, 1787)						
Xylomyiidae						
<i>Solva marginata</i> (Meigen, 1820)		5/1,	5/1, 7/3,	6/7, 7/14,	5/1, 6/11, 7/50,	5/2, 6/9,
				7/1	8/10	7/4, 8/1,
<i>Xylomyia maculata</i> (Meigen, 1804)						
Stratiomyidae						
<i>Actina chalybea</i> Meigen, 1804		5/103, 9/10,	5/28,	5/29, 9/2,	4/114,	5/82, 6/7,

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Beris clavipes</i> (Linnaeus, 1767)			8/1,		5/5, 6/5, 7/2, 5/401,	
<i>Beris geniculata</i> Curtis, 1870						
<i>Chloromyia formosa</i> (Scopoli, 1763)		6/1,		7/4,		6/1,
<i>Chloromyia speciosa</i> (Macquart, 1834)		6/1,	6/5,	6/3, 7/1, 8/1,	7/1,	6/2,
<i>Chorisops tibialis</i> (Meigen, 1820)		5/5,				
<i>Clitellaria ephippium</i> (Fabricius, 1775)		5/2, 6/1, 8/7,	5/1, 5/1,			6/1,
<i>Microchrysa polita</i> (Linnaeus, 1758)						
<i>Odontomyia ornata</i> (Linnaeus, 1758)						
<i>Oxycera pygmaea</i> (Fallén, 1817)		9/1,				
<i>Pachygaster atra</i> (Panzer, 1798)		6/4,	6/4, 7/3, 8/1,	6/4, 7/7, 8/1,	6/2, 7/26, 7/4, 8/1,	6/13, 7/7, 7/2, 8/2,
<i>Pachygaster leachii</i> (Curtis, 1824)						
<i>Sargus iridatus</i> (Scopoli, 1763)		10/1,		11/2,	9/1, 10/1, 11/1,	
<i>Sargus flavipes</i> Meigen, 1822						
Acroceridae						
<i>Ogodes gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)		6/1,		7/1,		
Therevidae						
<i>Acrosanthe annulata</i> (Fabricius, 1805)		6/1,				
<i>Thereva aurata</i> Loew, 1854			7/3,	5/1, 7/2, 7/1,		7/1,
<i>Thereva inornata</i> Verrall, 1909						
<i>Thereva microcephala</i> Loew, 1847					8/1,	
<i>Thereva nobilitata</i> (Fabricius, 1775)					7/1, 8/1, 7/1, 8/2,	
<i>Thereva praecox</i> Egger, 1859		7/3,		7/4,		7/3,
Bombyliidae						
<i>Anthrax varius</i> Fabricius, 1794				7/5,		7/1, 8/2,
<i>Anthrax trifasciatus</i> Meigen, 1804		6/1,				
<i>Bombylius major</i> Linnaeus, 1758		4/26, 5/5,	4/41, 5/2,	4/21, 5/4,		5/7, 8/1, 7/5, 8/2,
<i>Bombylitoma minimum</i> (Scopoli, 1772)	Č I., III.					
<i>Bombylius discolor</i> Mikan, 1796	Č I.					
<i>Bombylius pictus</i> Panzer, 1794	Č I.					
<i>Bombylius undatus</i> Mikan, 1796	Č I.					
<i>Bombylius venosus</i> Mikan, 1796	Č I.					
<i>Hemipenthes morio</i> (Linnaeus, 1758)	Č I.	5/2, 6/11,	6/1, 7/1,	7/2,	7/2,	6/3,
<i>Lomatia sabaeae</i> (Fabricius, 1781)	Č I.					
<i>Villa hottentotta</i> (Linnaeus, 1758)	Č I.	8/13, 9/4,	7/4, 8/3,			7/2, 8/1,
Asilidae						
<i>Choerades marginata</i> (Linnaeus, 1758)		5/1, 8/2,	7/4, 8/2,	7/4, 8/2,	7/1, 8/1,	6/1, 7/2, 8/4

Čeľad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Dioctria atricapilla</i> Meigen, 1803			6/6,			7/3,
<i>Dioctria hyalipennis</i> (Fabricius, 1794)			5/4, 6/5, 7/5,	6/4, 7/7,	5/1,	6/8,
<i>Dioctria linearis</i> (Fabricius, 1787)		5/2, 6/6,				5/4, 6/2,
<i>Dioctria longicornis</i> Meigen, 1820		5/1,				
<i>Holopogon priscus</i> (Meigen, 1820)			6/2, 7/2,	7/1,		8/2,
<i>Leptogaster cylindrica</i> (De geer, 1776)						
<i>Leptogaster guttiventris</i> Zetterstedt, 1842		6/1,				6/1, 7/1,
<i>Machimus atricapillus</i> (Fallén, 1814)		8/13, 9/2,	7/4, 8/3,	7/8, 8/11,	7/1, 8/3,	7/4,
<i>Neomochtherus flavipes</i> (Meigen, 1820)	Vz.		8/1,			
<i>Neoitamus cothurnatus</i> (Meigen, 1820)			6/3,			
<i>Neoitamus socius</i> (Loew, 1871)			5/2,	7/1, 8/1,	7/1,	6/1,
Empididae						
<i>Chelipoda vocatoria</i> (Fallén, 1815)	I. nálež v SR!				6/1,	
<i>Empis</i> (s.str.) <i>aestova</i> , Loew, 1867					6/1,	
<i>Empis</i> (s.str.) <i>bicuspidata</i> Collin, 1927					5/41,	
<i>Empis</i> (s.str.) <i>caudatula</i> Loew, 1867		4/53,				7/1,
<i>Empis</i> (<i>Leptempis</i>) <i>grisea</i> Fallén, 1816			4/1,			
<i>Empis</i> (<i>Kriempis</i>) <i>livida</i> Linnaeus, 1758		6/49, 8/4,	5/2, 6/12,	6/21, 7/27,	5/1, 7/10, 8/1,	5/2, 6/106,
<i>Empis</i> (<i>Xanthempis</i>) <i>lutea</i> Meigen, 1804		5/6, 6/17,	7/4, 8/1,			7/3,
<i>Empis</i> (s.str.) <i>nigripes</i> Fabricius, 1794		4/51, 5/142,	5/12, 6/26,	5/12, 6/24,	6/7, 7/12,	5/4, 6/47,
<i>Empis</i> (s.str.) <i>numita</i> Meigen, 1838			7/2, 8/1,	7/18,		7/39,
<i>Empis</i> (<i>Pachymeria</i>) <i>scotica</i> Curtis, 1835			4/1, 5/3, 6/12		5/72, 6/12,	5/25, 6/12,
<i>Empis</i> (<i>Xanthempis</i>) <i>scuellata</i> (Curtis, 1824)			4/2, 5/5,	4/1,	4/1, 5/15, 6/2,	5/87, 6/34,
<i>Empis</i> (s.str.) <i>simulium</i> Nowicki, 1868		4/7,				
<i>Empis</i> (<i>Xanthempis</i>) <i>stercorea</i> Linnaeus, 1761	Č I., K 78		5/2,			
<i>Empis</i> (<i>Euempis</i>) <i>tessellata</i> Fabricius, 1794		5/165,	4/1, 5/17,	4/10, 5/42,		6/2,
<i>Empis</i> (<i>Xanthempis</i>) <i>trigramma</i> Wiedemann, 1822		5/4,	5/2, 6/2,		5/38, 6/3,	5/88,
<i>Hilara albipilosa</i> Engel, 1943		5/1245,	5/28,	5/9,	5/8,	5/6,
<i>Hilara biseta</i> Collin, 1927	Č I.	4/10, 5/12, 6/3,	4/166, 5/171,	4/7, 5/26,	4/10, 5/56, 6/2,	
<i>Hilara cornicula</i> Loew, 1873	Č I.					6/3,
<i>Hilara galactoptera</i> Strobl, 1910	Č I.	6/1,	4/1, 5/4, 6/2,	6/1,		5/43, 6/2,
<i>Hilara intermedia</i> (Fallén, 1816)	Č I.	5/1,				
<i>Hilara lurida</i> (Fallén, 1816)	Č I.	4/6,				

Čeľad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Hilara maura</i> (Fabricius, 1776)	Č I.	5/11, 6/3,	5/5, 6/3, 5/46, 6/3, 5/2,	6/1, 5/3, 6/4,	5/2, 6/4,	5/1, 6/4, 6/2,
<i>Hilara monedula</i> Collin, 1927						
<i>Hilara pilosa</i> Zetterstedt, 1838						
<i>Hilara pruinosa</i> Wiedemann, 1822						
<i>Hilara quadrivittata</i> Meigen, 1822	Č I.					
<i>Hilara tetragramma</i> Loew, 1873	Č I.					
<i>Phylodromia melanocephala</i> (Fabricius, 1794)	Č I., K 78-79					
<i>Rhamphomyia (Pararhamphomyia) atra</i> Meigen, 1822			4/11, 5/15,	5/1,	5/1,	5/1,
<i>Rhamphomyia (Par.) barbata</i> (Macq., 1823)						
<i>Rhamphomyia (Aclonempis) longipes</i> (Meigen, 1804)	K 78	4/26, 5/219,	4/10, 5/19,	4/2, 5/2,	4/4, 5/20, 6/2,	5/5, 6/1, 5/1, 6/1, 6/1,
<i>Rhamphomyia (Aclonempis) nigripennis</i> (Fabricius, 1794)		4/1,	4/15, 5/2,			
<i>Rhamphomyia (s.str.) sulcata</i> (Meigen, 1804)		5/1,			5/33, 4/1,	6/1, 6/1,
<i>Rhamphomyia (s.str.) sulcatella</i> Collin, 1826		4/54,	4/1,			
<i>Trichopeza longicornis</i> (Meigen, 1822)			5/1,			
Hybotidae						
<i>Bicellaria spuria</i> (Fallén, 1816)		5/43, 6/2,	4/1, 5/57, 6/32	5/3, 11/1,	5/32,	5/22,
<i>Bicellaria sulcata</i> (Zetterstedt, 1842)	Č I.	8/1,	10/1,	9/1, 10/2,	9/1,	9/2,
<i>Drapetis (Elaphropeza) ephippiata</i> (Fallén, 1815)		8/1,		7/1,	6/3, 7/4,	8/1,
<i>Drapetis</i> (s.str.) <i>exilis</i> Meigen, 1822	Č I.		10/1,			
<i>Hybos culticiformis</i> (Fabricius, 1775)		8/1, 9/1,	7/1, 8/1,	7/1, 8/5, 9/5,	7/1, 8/6, 9/1,	9/1, 6/2,
<i>Leptopeza flavipes</i> (Meigen, 1820)			5/1,			
<i>Ocydromia glabricula</i> (Fallén, 1816)		5/1, 6/1,		5/1, 6/2, 6/1,	5/2, 6/2,	6/1,
<i>Oedalea flavipes</i> Zetterstedt, 1842	Č I.					
<i>Oedalea stigmatella</i> Zetterstedt, 1842						
<i>Oedalea zetterstedti</i> Collin, 1926		5/1,	5/3, 5/2, 6/2, 5/2, 11/1,	5/12,	5/4, 6/1, 7/1,	5/1, 6/1,
<i>Platypalpus agilis</i> (Meigen, 1822)						
<i>Platypalpus albiseta</i> (Panzer, 1806)						
<i>Platypalpus albisylus</i> Chvála, 1989						
<i>Platypalpus annulatus</i> (Fallén, 1815)						
<i>Platypalpus annulipes</i> (Meigen, 1822)			5/4, 5/2,	6/2, 5/7, 6/1,	6/3,	5/4,
<i>Platypalpus articulatus</i> Macquart, 1827						
<i>Platypalpus calceatus</i> (Meigen, 1822)	Č I.					
<i>Platypalpus candicans</i> (Fallén, 1815)					6/1, 7/1, 9/1,	

Čeľaď/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Platypalpus cothurnatus</i> Macquart, 1827	Č I.					
<i>Platypalpus cursitans</i> (Fabricius, 1775)	Č I.	6/1, 8/1,	6/14,	5/1, 6/1,	6/3, 8/1,	5/1, 6/1,
<i>Platypalpus dessarti</i> Grootaert, 1983	I. nál. SR!	6/1,	7/1,			
<i>Platypalpus ecalceatus</i> (Zetterstedt, 1838)						
<i>Platypalpus longicornis</i> (Meigen, 1822)	Č I.	5/2,	5/51, 7/1,	9/1,		
<i>Platypalpus major</i> (Zetterstedt, 1842)		5/1,		4/4, 5/12,	5/2, 7/1,	5/1, 6/3,
<i>Platypalpus minutus</i> (Meigen, 1804)				5/3,		5/1,
<i>Platypalpus nigrimanus</i> Strobl, 1880			6/2,			
<i>Platypalpus notatus</i> (Meigen, 1822)			5/1,			
<i>Platypalpus ochrocera</i> (Collin, 1961)			10/1,			
<i>Platypalpus pallidiventris</i> (Meigen, 1822)			6/3,			
<i>Platypalpus pictitarsis</i> (Becker, 1902)		8/1,	10/1, 11/1,		10/2, 11/2,	6/1,
<i>Symbalophthalmus fuscitarsis</i> (Zetterstedt, 1859)					8/1, 9/2,	8/1,
<i>Tachydromia annulimana</i> Meigen, 1822			10/2,		6/1,	
<i>Tachydromia arrogans</i> (Linnaeus, 1761)					6/1, 7/1,	
<i>Tachydromia connexa</i> Meigen, 1822					5/1, 6/2,	6/1,
<i>Tachydromia smithi</i> Chvála, 1966			10/1,		5/1,	6/1,
<i>Tachypeza fennica</i> Tuomikoski, 1932			10/2,			
<i>Tachypeza nubila</i> (Meigen, 1804)	Č I., K 79					
<i>Trichina elongata</i> Haliday, 1833	Č I., K 79					
<i>Trichina opaca</i> Loew, 1864						
Dolichopodidae						
<i>Argyra diaphana</i> (Fabricius, 1775)		8/2, 9/15, 10/4,	5/16, 6/12,	9/1, 10/5,	5/29, 6/2, 7/1,	5/4, 6/3,
<i>Chrysotimus molliculus</i> (Fallén, 1823)			7/1, 10/4,		8/5, 9/15, 10/3,	7/2, 8/7,
<i>Chrysotus cupreus</i> (Macquart, 1827)						9/10, 10/2,
<i>Dolichopus agilis</i> Meigen, 1824		9/10,	6/21, 7/80,		4/1,	
<i>Dolichopus festivus</i> Haliday, 1832			8/9,	7/31, 8/13,	6/5, 7/17,	6/11, 10/2,
<i>Dolichopus flavipes</i> (Stannius, 1831)				6/4,		
<i>Dolichopus griseipennis</i> Stannius, 1831		6/2,	5/3, 6/7, 7/7,	7/2, 8/5, 9/5,	8/2,	6/5, 7/23,
<i>Dolichopus hilaris</i> Loew, 1862			10/1,			8/26,
<i>Dolichopus latilimbatus</i> Macquart, 1827			7/1,		7/1,	10/7,
<i>Dolichopus nigricornis</i> Meigen, 1824	I. nález v SR!	5/1,			10/2,	7/1,
				5/2, 6/1,	6/3,	

Čeľad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Dolichopus nubilus</i> Meigen, 1824	10/6,					5/3, 6/12, 7/1, 9/50, 7/1,
<i>Gymnopternus aerosus</i> (Fallén, 1823)						
<i>Gymnopternus cupreus</i> (Fallén, 1823)						
<i>Hercostomus chaerophylli</i> (Meigen, 1824)	5/1,			7/1,	6/3, 10/3, 5/8, 11/1,	5/2, 7/1,
<i>Hercostomus chalybeus</i> (Wiedemann, 1817)						
<i>Hercostomus fugax</i> (Loew, 1857)						
<i>Hercostomus fuscipennis</i> (Meigen, 1824)			5/2,		4/1, 6/41,	
<i>Hercostomus metallicus</i> (Stannius, 1831)	6/2,			6/5, 6/1, 5/1,	5/9,	
<i>Hercostomus nanus</i> (Macquart, 1827)						
<i>Hercostomus nigrilamellatus</i> (Macquart, 1827)						
<i>Hercostomus rusticus</i> (Meigen, 1824)	5/1,				7/2, 8/1,	
<i>Hydrophorus viridis</i> (Meigen, 1824)						
<i>Medetera flavipes</i> Meigen, 1824						
<i>Medetera glauca</i> Loew, 1869			10/21,			7/10,
<i>Medetera micacea</i> Loew, 1857	4/1, 6/1,			3/1, 5/4, 7/1,		
<i>Medetera obscura</i> (Zetterstedt, 1838)						
<i>Medetera petrophiloides</i> Parent, 1925	4/1,					
<i>Microphor crassipes</i> Macquart, 1834	4/1, 5/88, 6/27, 8/1		4/2, 5/12, 6/21	5/6, 6/3, 7/44, 9/1, 5/12, 6/15,	6/14, 6/6, 7/2, 10/1, 5/40, 6/15,	5/15, 6/40, 6/7, 5/5, 6/12,
<i>Neurigona pallida</i> (Fallén, 1823)			8/3,			
<i>Neurigona quadrifasciata</i> (Fabricius, 1781)	5/10, 6/14,		5/37, 6/26, 7/1,			
<i>Poecilobothrus chrysozygos</i> (Wiedemann, 1817)						
<i>Rhaphium commune</i> (Meigen, 1824)	8/1,				5/2, 7/13, 8/17,	6/1, 6/1, 7/2,
<i>Rhaphium longicorne</i> (Fallén, 1823)						
<i>Rhaphium micans</i> (Meigen, 1824)	4/1,					
<i>Rhaphium rivale</i> (Loew, 1869)	6/5,				6/3,	6/6,
<i>Sciapus platypterus</i> (Fabricius, 1805)	8/2,		6/4,	6/24, 7/1, 7/1,	6/1, 7/2, 8/1,	8/1,
<i>Xanthochlorus ornatus</i> (Haliday, 1832)						
<i>Xanthochlorus tenellus</i> (Wiedemann, 1870)						
Platypezidae						
<i>Callomyia speciosa</i> Meigen, 1824				8/1,	10/1,	
<i>Lindheromyia dorsalis</i> (Meigen, 1804)						
<i>Paraplatelypeza atra</i> (Meigen, 1804)						
<i>Platelypeza consobrina</i> Zetterstedt, 1844	4/2,	4.1				
<i>Polyporivora picta</i> (Meigen, 1830)				10/1, 11/1,		

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
Phoridae						
<i>Anevrina thoracica</i> (Meigen, 1804)	Č II.			5/1, 3/1,		
<i>Anevrina unispinosa</i> (Zetterstedt, 1860)				5/2, 5/1,		
<i>Chaetopleurophora spinosior</i> Schmitz, 1938		4/4,				
<i>Conicera dauci</i> (Meigen, 1830)	Č II.					
<i>Conicera floricola</i> Schmitz, 1938	Č II.					
<i>Diplonevra abbreviata</i> (von Roser, 1840)	Č II.				6/33, 8/1,	6/1, 7/3,
<i>Diplonevra concinna</i> (Meigen, 1830)	Č II.					
<i>Diplonevra florea</i> (Fabricius, 1794)	Č II.	6/1,		7/1,	5/1,	
<i>Diplonevra funebris</i> (Meigen, 1830)	Č II.					
<i>Diplonevra lophochaeta</i> Schmitz, 1927	Č II.					
<i>Diplonevra nitidula</i> (Meigen, 1830)	Č II.	4/1, 8/1,	4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 10/1,	3/11, 6/2,	6/1,	
<i>Diplonevra sesquicornis</i> Schmitz, 1927	Č II.					
<i>Diplonevra unisetalis</i> SCHMITZ, 1935	Č II.					
<i>Gymnophora arcuata</i> (Meigen, 1830)	Č II.	6/1,	4/1, 6/1, 10/1	4/1, 6/1,	5/1, 6/2, 4/4,	
<i>Gymnophora vitripennis</i> (Meigen, 1830)	Č II.					
<i>Hypocera mordellaria</i> (Fallén, 1823)	Č II.	4/2, 5/2,	5/31, 6/2,	5/3, 6/2,	5/22, 6/2,	7/2,
<i>Megaselia aequalis</i> (Wood, 1909)	Č II.					
<i>Megaselia altifrons</i> (Wood, 1909)	Č II.					
<i>Megaselia angularis</i> (Schmitz, 1924)	Č II.					
<i>Megaselia angustifrons</i> (Wood, 1912)	Č II.					
<i>Megaselia brevicostalis</i> (Wood, 1910)	Č II.				5/1,	
<i>Megaselia ciliata</i> (Zetterstedt, 1848)	Č II.					
<i>Megaselia conformis</i> (Wood, 1909)	Č II.					
<i>Megaselia consetigera</i> (Schmitz, 1925)	Č II.					
<i>Megaselia divergens</i> (Malloch, 1812)	Č II.					
<i>Megaselia emarginata</i> (Wood, 1908)	Č II.					
<i>Megaselia flava</i> (Fallén, 1823)	Č II.	9/1,	4/1, 6/1, 7/3, 8/7, 10/3,	7/20,	6/1, 7/1,	6/1, 7/5,
<i>Megaselia frontalis</i> (Wood, 1909)	Č II.					
<i>Megaselia fusca</i> (Wood, 1909)	Č II.					
<i>Megaselia fuscicornis</i> (Wood, 1908)	Č II.			8/3,		8/2, 7/2, 9/3,
<i>Megaselia fuscovariata</i> Schmitz, 1933	Č II.					
<i>Megaselia giraudii</i> (Egger, 1862)	Č II.					
<i>Megaselia glabrifrons</i> (Wood, 1909)	Č II.		10/8,			

Čeľad/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Megaselia humeralis</i> (Zetterstedt, 1838)	Č II.		10/7,	8/2,	6/1,	
<i>Megaselia incassata</i> (Schmitz, 1920)	Č II.					
<i>Megaselia involuta</i> (Wood, 1910)	Č II.			6/1,		6/1, 8/3,
<i>Megaselia lutea</i> (Meigen, 1830)						
<i>Megaselia major</i> (Wood, 1912)	Č II.					
<i>Megaselia meigeni</i> (Becker, 1901)	Č II.					
<i>Megaselia minor</i> (Zetterstedt, 1848)	Č II.	5/1,	10/20, 11/2,	8/3, 10/1,		5/1, 7/3,
<i>Megaselia nasoni</i> (Malloch, 1914)	Č II.					
<i>Megaselia nudiventris</i> (Wood, 1909)	Č II.			8/2,		6/1,
<i>Megaselia pleuralis</i> (Wood, 1909)	Č II.					
<i>Megaselia posticata</i> (Meigen, 1830)	Č II.					
<i>Megaselia propingua</i> (Wood, 1909)	Č II.		10/2,			
<i>Megaselia pulicaria</i> (Fallén, 1823)	Č II.		10/3,			6/1,
<i>Megaselia pusilla</i> (Meigen, 1830)	Č II.				8/5,	
<i>Megaselia pygmaea</i> (Zetterstedt, 1848)	Č II.				5/5, 6/1,	
<i>Megaselia quadriseta</i> (Schmitz, 1918)	Č II.		4/1, 5/5, 6/1,	5/2,	4/1, 6/2,	
<i>Megaselia rivalis</i> (Wood, 1909)						
<i>Megaselia rufa</i> (Wood, 1908)	Č II.					7/2,
<i>Megaselia ruficornis</i> (Meigen, 1830)	Č II.					
<i>Megaselia rufipes</i> (Meigen, 1804)	Č II.	4/1, 10/1,	6/1, 10/15,	11/5,	5/1, 6/1, 11/1,	6/5, 7/3,
			11/30,			
				8/11,		
<i>Megaselia sepulchralis</i> (Lundbeck, 1920)	Č II.					
<i>Megaselia spinicincta</i> (Wood, 1910)	Č II.					
<i>Megaselia subnitida</i> (Lundbeck, 1820)	Č II.					
<i>Megaselia subnudipennis</i> (Schmitz, 1919)	Č II.					
<i>Megaselia subpleuralis</i> (Wood, 1909)	Č II.					
<i>Megaselia sulphuripes</i> (Meigen, 1830)	Č II.	10/5,			8/2,	9/3,
<i>Megaselia valvata</i> Schmitz, 1935	Č II.					
<i>Megaselia vestita</i> (Wood, 1914)	Č II.					
<i>Megaselia virilis</i> (Schmitz, 1919)	Č II.					
<i>Metopina galeata</i> (Haliday, 1883)	Č II.		5/1,		8/1,	8/5,
<i>Phalacrotophora berolinensis</i> Schmitz, 1920	Č II.					
<i>Phalacrotophora fasciata</i> (Fallén, 1823)	Č II.					
<i>Phora atra</i> (Meigen, 1804)	Č II.	4/1, 9/2,	5/1,	7/1, 10/6, 11/1,	8/1,	6/1,
<i>Phora penicillata</i> Schmitz, 1820	Č II.		6/1, 7/2, 8/2,	8/3, 10/2,		7/2,
<i>Pseudacteon formicarium</i> (Verrall, 1877)	Č II.					

Čeľad/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Spiniphora bergenstammii</i> (Mik, 1864)	Č II.	4/1,				
<i>Triphleba hyalinata</i> (Meigen, 1830)		3/1,				
<i>Triphleba nudipalpis</i> (Becker, 1901)	Č II.		10/5,	9/1, 7/1, 8/1,	7/1,	
<i>Triphleba opaca</i> (Meigen, 1830)						
Lonchopteridae						
<i>Lonchoptera lutea</i> Panzer, 1809		4/2,	6/1, 10/1, 4/2,	7/1, 10/1, 4/1,	10/2, 11/1, 5/1,	7/1,
<i>Lonchoptera nigrociliata</i> Duda, 1927						
Syrphidae						
<i>Anasimyia lunulata</i> Meigen, 1822	Č II., Vz., I. SR?				5/1,	6/1,
<i>Anasimyia transfuga</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.		5/1,	5/1, 11/1,	4/4, 5/6, 6/1, 7/1, 8/1, 10/2, 11/2	7/1,
<i>Baccha elongata</i> (Fabricius, 1775)	Č II.				4/2, 5/1,	
<i>Brachymyia berberina</i> (Fabricius, 1805)						
<i>Brachymyia floccosa</i> (Meigen, 1822)			3/1, 4/2,		4/1, 5/2,	
<i>Brachyopa pilosa</i> Collin, 1939		5/2,	4/11, 5/3, 5/2,	4/2, 5/1, 4/2, 5/2, 5/1, 5/6,	5/1,	
<i>Brachyopa testacea</i> (Fallén, 1817)						
<i>Brachypalpus lentus</i> (Meigen, 1822)						
<i>Brachypalpus laphriformis</i> (Fallén, 1816)	Č II.					
<i>Brachypalpus valgus</i> (Panzer, 1798)	Č II.	5/1,				
<i>Calliprobola speciosa</i> (Rossi, 1790)	Č II., Vz.					
<i>Ceriana conopsoides</i> (Linnaeus, 1758)		8/4,	7/1, 8/1,	8/1,	6/3, 7/2, 8/18,	6/3, 7/3, 8/1, 9/1,
<i>Chalcosyrphus (Xylotina) nemorum</i> (Fabricius, 1805)						
<i>Cheilosia aerea</i> Dufour, 1848	Č II.					
<i>Cheilosia albipila</i> Meigen, 1838		4/1,				5/1,
<i>Cheilosia albicans</i> (Meigen, 1822)						
<i>Cheilosia carbonaria</i> Egger, 1860	Č II.	9/20,	4/1,	4/1,		
<i>Cheilosia chloris</i> (Meigen, 1822)	Č II.					
<i>Cheilosia impressa</i> Loew, 1840	Č II., Vz.					
<i>Cheilosia laeviventris</i> Loew, 1857		5/1,				
<i>Cheilosia latifacies</i> Loew, 1857	Č II., Vz.					
<i>Cheilosia longula</i> (Zetterstedt, 1838)	Č II.					
<i>Cheilosia mutabilis</i> (Fallén, 1817)	Č II.					
<i>Cheilosia pagana</i> (Meigen, 1822)	Č II.	9/1,				8/5,
<i>Cheilosia praecox</i> (Zetterstedt, 1843)	Č II.					

Čel'ad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Cheilosia proxima</i> (Zetterstedt, 1843)	Č II.				9/2,	
<i>Cheilosia scutellata</i> (Fallén, 1817)	Č II.				9/1,	
<i>Cheilosia (Eucartosyrphus) soror</i> (Zetterstedt, 1843)	Č II.		6/2,			
<i>Cheilosia variabilis</i> (Panzer, 1798)	Č II.					
<i>Cheilosia vernalis</i> (Fallén, 1817)	Č II.					
<i>Cheilosia vulpina</i> (Meigen, 1822)	Č II.					
<i>Chrysogaster solstitialis</i> (Fallén, 1817)	Č II.					
<i>Chrysotoxum arcuatum</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.		5/3, 7/1,	7/1,		6/2,
<i>Chrysotoxum bicinctum</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.		7/4, 8/2,	7/1, 8/1,	7/1,	6/1, 7/3, 8/1
<i>Chrysotoxum cautum</i> (Harris, 1776)	Č II.	5/1, 6/1,	5/5, 6/2,	5/1,	5/1,	5/25, 6/4,
<i>Chrysotoxum elegans</i> Loew, 1841	Č II.	8/2,				
<i>Chrysotoxum festivum</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.			8/1,		6/1,
<i>Chrysotoxum intermedium</i> Meigen, 1822	Č II.					
<i>Chrysotoxum octomaculatum</i> Curtis, 1838	Č II.					
<i>Chrysotoxum vernale</i> Loew, 1841	Č II.	4/2, 5/1,	5/8,			
<i>Criorhina asilica</i> (Fallén, 1816)	Č II.	4/2,		4/1, 7/1,		
<i>Criorhina pachymera</i> Egger, 1858	Č II.		4/5, 5/2,	4/3,		
<i>Criorhina ranunculi</i> (Panzer, 1804)	Č II.		5/1,	4/1,		
<i>Dasydyrphus albostrigatus</i> (Fallén, 1817)	Č II.					
<i>Dasydyrphus tricornis</i> (Fallén, 1817)	Č II.					
<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)	Č II.	5/11, 8/7, 11/1,	4/1,			7/1,
	Č II.		3/3, 4/5, 5/1,	3/5, 4/2, 5/1,	5/2, 6/14, 7/57,	8/2,
	Č II.		6/8, 7/93,	6/12, 8/3, 10/3,	8/29, 9/2, 11/2,	6/4, 7/8,
	Č II.		8/2, 11/1,	11/5,		8/3,
	Č II.	4/71, 5/77, 6/2,	4/18, 5/62, 6/2	4/1, 5/8, 7/46,	5/4,	5/12,
<i>Epistrophe eligans</i> (Harris, 1782)	Č II.					
<i>Epistrophe nitidicollis</i> (Meigen, 1822)	Č II.		6/1,			
<i>Epistrophe ochrostoma</i> (Zetterstedt, 1849)	Č II.					
<i>Eristalinus (Lathyrrophthalmus) aeneus</i> (Scopoli, 1763)	Č II.					
<i>Eristalinus (Eoseristalis) sepulcralis</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Eristalis (Eoseristalis) abusivum</i> Collin, 1931	Č II.					
<i>Eristalis (Eoseristalis) arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Eristalis (Eoseristalis) horticola</i> (De Geer, 1776)	Č II.					
<i>Eristalis (Eoseristalis) intricarius</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Eristalis (Eoseristalis) nemorum</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.		5/1, 7/1, 8/1,			6/1,
<i>Eristalis (Eoseristalis) pertinax</i> (Scopoli, 1763)	Č II.					
<i>Eristalis (Eoseristalis) pratensis</i> Meigen, 1822	Č II.					
<i>Eristalis (s.str.) tenax</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.	4/1, 5/3,	4/1,	10/1,	5/1, 10/1,	6/2,

Čeľad/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Eumerus ornatus</i> Meigen, 1822	Č II.					
<i>Eumerus strigatus</i> (Fallén, 1817)	Č II.	5/1, 6/1,	6/1,			
<i>Eupeodes</i> (s.str.) <i>corollae</i> (Fabricius, 1794)	Č II.	4/2, 6/1,	4/4, 5/2,	4/1, 8/1,		
<i>Eupeodes</i> (<i>Lapposyrphus lapponicus</i> (Zetterstedt, 1838)	Č II.	4/1, 6/1, 9/1,	10/1,	5/3,	5/1, 8/2,	6/1, 7/5, 8/1
<i>Eupeodes</i> (s.str.) <i>luniger</i> (Meigen, 1822)	Č II.					
<i>Eupeodes</i> (s.str.) <i>nielsenii</i> Dušek et Láška, 1976	Č II.					
<i>Ferdinandea cuprea</i> (Scopoli, 1763)	Č II., Vz.			8/1,	8/1,	8/2,
<i>Helophilus hybridus</i> Loew, 1846	Č II.				5/1,	7/1,
<i>Helophilus pendulus</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.	4/6, 5/22, 6/2,	7/1,		7/1,	6/1,
<i>Helophilus trivittatus</i> (Fabricius, 1805)	Č II.	8/2, 9/1, 10/2,	4/7, 5/10,	5/9, 9/1,	4/3, 5/19, 6/4,	5/3, 6/2,
		5/1,	6/2, 11/1,	9/1,	9/1,	
<i>Heringia</i> (s.str.) <i>heringi</i> (Zetterstedt, 1843)	Č II., r.				7/1,	6/1,
<i>Lapposyrphus lapponicus</i> (Zetterstedt, 1838)						
<i>Lejops vittata</i> (Meigen, 1822)						
<i>Leucozona lucorum</i> (Linnaeus, 1758)			7/1,			6/1,
<i>Megasyrphus annulipes</i> (Zetterstedt, 1838)					10/2,	6/1,
<i>Melangyna umbellatarum</i> (Fabricius, 1794)	Č II.	4/6, 5/1,	6/1,	6/1,		
<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758)		4/7, 5/2, 6/5, 8/6,	4/1, 6/2, 8/8,	7/3,	4/1, 5/1, 6/7, 7/5,	6/7, 7/45,
<i>Melanostoma scalare</i> (Fabricius, 1794)		9/10, 10/1,		7/1, 9/1,	8/3, 9/2, 10/1,	8/5, 9/2,
<i>Meliscaeva cinctella</i> (Zetterstedt, 1843)	Č II.					
<i>Meligramma guttata</i> (Fallén, 1817)	Vz.				9/3,	
<i>Merodon armipes</i> Rondani, 1843	Č II.					
<i>Merodon avidus</i> (Rossi, 1790)	Č II.	5/1, 6/1,				
<i>Merodon constans</i> (Rossi, 1794)	Č II., Vz.					
<i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Myolepta obscura</i> Becker, 1883	Č II.					
<i>Neoscia interrupta</i> (Meigen, 1822)		4/1,				5/1,
<i>Neoscia podagrica</i> (Fabricius, 1775)	Č II., Vz.					
<i>Orthonevra frontalis</i> (Loew, 1843)	Č II.				5/1,	10/1,
<i>Orthonevra nobilis</i> (Fallén, 1817)	Č II.	4/1,			4/1, 6/2, 8/1,	6/1,
<i>Paragus</i> (s.str.) <i>bicolor</i> (Fabricius, 1794)	Vz.					8/1,
<i>Paragus finitimus</i> Goeldlin de Tiefenau, 1976						
<i>Parasyrphus annulatus</i> (Zetterstedt, 1838)	Č II.					
<i>Parasyrphus lineola</i> (Zetterstedt, 1843)	Č II.					
<i>Parhelophilus frutetorum</i> (Fabricius, 1775)		9/1,	4/1,			

Čel'ad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Parhelophilus versicolor</i> (Fabricius, 1794)	Č II.	4/1,				
<i>Peleocera tricineta</i> Meigen, 1822	Č II.	4/2, 5/3,	4/1, 5/7, 6/1,	5/2,	4/1, 5/3,	8/2, 5/4, 6/2,
<i>Pipiza festiva</i> Meigen, 1822	Č II.					
<i>Pipiza luteitarsis</i> Zetterstedt, 1843	Č II.					
<i>Pipiza noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.			6/1,	6/3,	6/1,
<i>Pipiza quadrimaculata</i> (Panzer, 1804)	Č II.					
<i>Pipizella viduata</i> (Meigen, 1822)	Č II.					
<i>Pipizella virens</i> (Fabricius, 1805)	Č II.	4/1, 5/2, 6/1,	5/3, 6/4,	5/2, 6/2,	6/2,	5/1, 6/2,
<i>Platycheirus</i> (s.str.) <i>albimanus</i> (Fabricius, 1781)	Č II.					
<i>Platycheirus</i> (s.str.) <i>ambiguus</i> (Fallén, 1817)	Č II.					
<i>Platycheirus</i> (s.str.) <i>angustatus</i> (Zetterstedt, 1843)	Č II.	4/1,	10/1,			
<i>Platycheirus</i> (s.str.) <i>clypeatus</i> (Meigen, 1822)	Č II.	5/1,	4/3,		5/1,	
<i>Platycheirus</i> (s.str.) <i>discimanus</i> Loew, 1871	Č II.	5/1, 6/1, 8/1,	4/5, 6/2, 8/8,	7/1, 8/1,	7/1, 8/1,	5/1, 6/4, 7/18, 8/5, 9/1,
<i>Platycheirus</i> (s.str.) <i>fulviventris</i> (Macquart, 1827)	Č II.	9/15,				
<i>Platycheirus</i> (s.str.) <i>manicatus</i> (Meigen, 1822)	Č II.	4/1, 5/1,	4/1, 5/2,			
<i>Platycheirus</i> (s.str.) <i>peltatus</i> (Meigen, 1822)	Č II.	4/1,	4/1, 5/1,	4/1, 5/2,		
<i>Platycheirus</i> (<i>Pyrophaena</i>) <i>rosarum</i> (Fabricius, 1787)	Č II.	9/2,	7/1,	8/1,		6/1, 8/1,
<i>Platycheirus</i> (s.str.) <i>scambus</i> (Staeger, 1843)	Č II.	6/2,				
<i>Platycheirus</i> (s.str.) <i>scutatus</i> (Meigen, 1822)	Č II.					
<i>Pocota personata</i> (Harris, 1780)	Č II.					
<i>Portevinia maculata</i> (Fallén, 1817)	Č II., Vz.					
<i>Psarus abdominalis</i> (Fabricius, 1794)	Č II., Vz.		4/3, 5/1,	4/2,	5/5, 5/1, 4/2, 6/4,	5/1,
<i>Psilota anthracina</i> Meigen, 1822	Č II., Vz.					
<i>Rhingia campestris</i> Meigen, 1822	Č II.		6/1, 7/1,		5/1,	5/3, 6/3,
<i>Sphaerophoria menthasri</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Sphaerophoria rueppelli</i> (Wiedemann, 1830)	Č II.	4/2, 5/5, 6/25, 8/30, 9/25,	4/21, 5/6, 6/1, 7/30, 8/15,	7/10, 8/4,	7/15, 8/5, 9/1,	5/2, 6/7, 7/24, 8/34, 9/1,
<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Sphiximorpha subseffilis</i> (Illiger in Rossi, 1807)	Č II., Vz.					
<i>Scavea pyrastri</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.	4/1,				6/1, 7/1,
<i>Scavea selenetica</i> (Meigen, 1822)	Č II.					
<i>Sericomyia lappona</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.	4/25, 5/8, 6/2, 8/1, 9/2,	7/1, 4/31, 5/9, 7/4,	4/13, 5/2, 7/1, 9/1,	5/14, 6/1, 8/3,	5/5, 6/10,
<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.	4/11,				
<i>Syrphus torvus</i> Osten Sacken, 1875	Č II.					

Čeľad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822		5/11, 6/1, 8/3, 10/4, 11/1,	4/5, 5/15, 6/1, 7/1, 8/6,	4/3, 5/2, 7/3, 8/1, 9/1, 10/2,	4/4, 5/16, 7/1, 9/1	5/1, 6/2, 7/6, 8/1, 9/1, 8/1, 5/1,
<i>Syrpita pipiens</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.		5/2, 6/1,	5/3,	5/6, 5/4,	7/5, 8/5,
<i>Tennotoma bombylans</i> (Fabricius, 1805)		5/1,	6/1, 8/1,	6/1,		6/1, 7/2,
<i>Tennotoma vespiforme</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.	5/1,		6/2,		8/1,
<i>Trichopsomyia flavitarsis</i> (Meigen, 1822)	Č II.	5/1,	6/1,			8/1,
<i>Tropidia scita</i> (Harris, 1780)						
<i>Volucella bombylans</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Volucella inanis</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Volucella pellucens</i> (Linnaeus, 1758)						
<i>Xanthandrus comtus</i> (Harris, 1776)						
<i>Xanthogramma festivus</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Xanthogramma pedisseguum</i> (Harris, 1776)	Č II.	5/1, 6/1, 8/6, 9/1,	5/1, 6/1, 8/5, 7/2,	4/2,	8/1,	5/2, 6/1, 8/3
<i>Xylota florum</i> (Fabricius, 1805)		7/1,	8/1,	10/1, 8/1,	6/1, 7/2, 8/18,	6/3, 7/3, 8/1, 9/1, 6/1, 8/1,
<i>Xylota lenta</i> Meigen, 1822		8/4,				
<i>Xylota nemorum</i> (Fabricius, 1805)		8/1,	4/1, 5/2, 7/1, 10/1,		5/1,	6/1,
<i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Xylota sylvarum</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
Pipunculidae						
<i>Cephalops perspicuus</i> (de Meijere, 1907)	Č II., Vz.					
<i>Cephalops semifumosus</i> (Kowarz, 1887)	Č II.					
<i>Cephalops vittipes</i> (Zetterstedt, 1844)	Č II.					
<i>Dorylomorpha</i> (s.str.) <i>hungarica</i> Aczél, 1939	Č II.	5/1,				
<i>Eudorylas subterminalis</i> Collin, 1956	Č II.					
<i>Pipunculus campestris</i> Latreille, 1802	Č II.	5/1, 8/5,	5/1, 6/1, 7/1, 8/1	8/1,	6/2,	6/2, 7/1, 9/1
<i>Pipunculus fonssecai</i> Coe, 1966	Č II., Vz.					
<i>Pipunculus oldenbergi</i> Collin, 1956	Č II.					
<i>Pipunculus spinipes</i> Meigen, 1830	Č II.	9/4,	7/1,	7/1,		6/2, 5/1, 7/5, 8/2
<i>Pipunculus thomsoni</i> Becker, 1897	Č II.					
<i>Tomosvaryella sylvatica</i> (Meigen, 1824)	Č II.	5/2, 8/1, 9/2, 5/2,	5/1, 7/4, 8/2, 10/2, 6/1,		6/1,	
<i>Verrallia aucta</i> (Fallén, 1817)						
Micropezidae						
<i>Compsobata cibaria</i> (Linnaeus, 1761)			5/2, 6/1,	6/1,	5/12, 6/10, 7/4, 8/5 6/2,	
<i>Micropeza corrigiolata</i> (Linnaeus, 1767)						

Čeľad/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Rainieria calceata</i> (Fallén, 1820)				7/1,		
Tanypezidae						
<i>Tanypeza longimana</i> Fallén, 1820		10/1,				9/1,
Megamerinidae						
<i>Megamerina dolium</i> (Fabricius, 1805)					5/1, 6/4, 7/1, 8/1	
Psilidae						
<i>Chamaepsila</i> (s.str.) <i>nigricornis</i> (Meigen, 1826)	Č II.	5/13, 6/2,	5/22, 6/5,	5/22, 6/1,		5/4, 6/4,
<i>Chamaepsila</i> (s.str.) <i>nigrosetosa</i> Frea, 1925	Č II.	9/11, 10/7, 11/1,	10/5,	6/1, 8/5, 9/3, 10/7, 11/2,	6/1, 9/10, 10/2,	8/6, 10/1,
<i>Chamaepsila</i> (s.str.) <i>rosae</i> (Fabricius, 1794)		9/1,	5/14, 8/1,	5/1, 10/2,	7/1, 8/2,	
<i>Chamaepsila</i> (<i>Tetapsila</i>) <i>obscuritarsis</i> (Loew, 1856)						
<i>Loxocera aristata</i> (Panzet, 1801)						
<i>Psila fimetaria</i> (Linnaeus, 1761)	Č II.					
<i>Psila merdaria</i> Collin, 1944	Č II.					
Conopidae						
<i>Conops flavipes</i> Linnaeus, 1758		8/5, 9/5,	7/2, 8/2,	8/1, 8/1,		8/7, 8/7,
<i>Conops scutellatus</i> Meigen, 1804		8/2,				
<i>Conops vesicularis</i> Linnaeus, 1761		5/1,				
<i>Myopa buccata</i> (Linnaeus, 1758)		5/1,			6/1,	
<i>Sicus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)						
<i>Thecophora atra</i> (Fabricius, 1775)		8/2,	5/1, 5/1, 7/1, 8/1,			7/1, 8/5, 9/2
Lonchaeidae						
<i>Dasitops facialis</i> Collin, 1953					5/1,	5/1, 6/1,
<i>Earomyia viridana</i> (Meigen, 1826)	Č II.		5/8, 6/2,	10/1, 11/1,		
<i>Lonchaea figax</i> Becker, 1895		8/1, 9/1, 11/1,	5/1, 6/2, 10/2	8/5, 10/1,	8/5, 9/10, 10/6,	6/1, 8/2, 9/6
<i>Lonchaea chorea</i> (Fabricius, 1781)	Č II.					
<i>Setisquamalonchaea fumosa</i> (Egger, 1862)	Č II.				11/5,	
<i>Setisquamalonchaea retalionis</i> (Mc Alpine, 1964)	Č II., Vz.					
Pallopteridae						
<i>Palloptera saltuum</i> (Linnaeus, 1758)						
<i>Palloptera umbellatarum</i> (Fabricius, 1775)		10/1,	5/2, 8/1, 7/1,	11/2, 6/1,	7/1,	
<i>Palloptera ustulata</i> Fallén, 1820	Č II.					
Piophilidae						
<i>Liopiophila varipes</i> (Meigen, 1830)	Č II.					
<i>Parapiophila vulgaris</i> (Fallén, 1820)	Č II.					

Čeľad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
Otitidae						
<i>Ceroxys hortulana</i> (Rossi, 1790)		4/1,	3/4, 4/2,			
<i>Herina palustris</i> (Meigen, 1826)	Č II.					
<i>Myennis octopunctata</i> (Coquebert, 1798)	Č II.					
<i>Otitus bacescui</i> Gheorghiu, 1987	Č II.					
<i>Otitus centralis</i> (Fabricius, 1805)	Č II.	4/5, 5/29,	4/2, 5/74, 6/2	4/19, 5/14, 6/1,	4/1, 5/2, 6/2,	5/6, 6/2,
<i>Otitus formosa</i> (Panzer, 1798)	Č II.	5/9, 6/16,	5/11, 6/7,	5/22, 6/6, 7/2,	6/26,	5/3, 6/6,
<i>Otitus guttata</i> (Meigen, 1830)	Č II.		6/1,			
<i>Otitus levigata</i> (Loew, 1873)	Č II.					5/2, 6/2,
<i>Otitus lamed</i> (Schrank, 1781)	Č II.				6/1,	
<i>Seioptera vibrans</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
Platystomatidae						
<i>Platystoma gemmatonnis</i> (Rondani, 1869)		6/155,	5/14, 6/5,			
<i>Platystoma seminationis seminationis</i> (Fabricius, 1775)	Č II.	5/361, 6/25,	5/2, 6/32, 7/2	5/51, 6/71, 7/18	5/2, 6/11, 7/21,	5/20, 6/54, 7/7
Tephritidae						
<i>Acidia cognata</i> (Wiedemann, 1817)			6/1,	8/1,		
<i>Acidia corniculata</i> (Zetterstedt, 1819)	K 98		8/1,			
<i>Anomoia permunda</i> (Harris, 1776)	K 98	8/1, 9/3,	8/2,			5/1,
<i>Campiglossa doronici</i> (Loew, 1856)			10/1,			
<i>Campiglossa loewiana</i> (Hendel, 1927)						
<i>Chaetorellia jaceae</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)	K 98					
<i>Euleia heraclei</i> (Linnaeus, 1758)	K 98					
<i>Orellia tussilaginis</i> (Fabricius, 1775)		8/1,				
<i>Oxyina flavipennis</i> (Loew, 1844)	K 98					
<i>Oxyina parietina</i> (Linnaeus, 1758)	K 98		5/1,			
<i>Paroxyina doronici</i> (Loew, 1856)			8/2,		8/1,	8/1, 9/1,
<i>Philophylla caesio</i> (Harris, 1776)	K 98					
<i>Rhagoletis alternata</i> (Fallén, 1814)	K 98					
<i>Rhagoletis cerasi</i> (Linnaeus, 1758)	K 98					
<i>Tephritis arnicae</i> (Linnaeus, 1758)				7/1,	7/41, 8/7,	6/10, 7/8, 8/2
<i>Tephritis bardanae</i> (Schrank, 1803)				8/3,		
<i>Tephritis conura</i> (Loew, 1844)	K 98		6/1,			5/1,
<i>Tephritis formosa</i> (Loew, 1844)		5/1,	7/1,			
<i>Tephritis hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)	K 98				10/2, 11/1,	
<i>Terellia</i> (s.str.) <i>ruficauda</i> (Fabricius, 1794)	K 98					
<i>Terellia (Cerajocera) tussilaginis</i> (Fabricius, 1775)	K 98					5/1,

Čeľad/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Trypeta zoe</i> Meigen, 1826	K 98					
<i>Urophora</i> (s.str.) <i>quadrfasciata</i> (Meigen, 1826)	K 98					
<i>Urophora</i> (s.str.) <i>stylata</i> (Fabricius, 1775)	K 98					
<i>Xyphosia militaria</i> (Schrank, 1781)	K 98		5/1, 7/1,	8/1,		6/1, 8/1,
Lauxaniidae						
<i>Autogastromyza anisodactyla</i> (Loew, 1845)	Č II., S-K 09					
<i>Calliopus aeneum</i> (Fallén, 1820)	Č II., S-K 09					
<i>Calliopus elisae</i> (Meigen, 1826)	Č II.					
<i>Calliopus similimum</i> (Collin, 1933)	S-K 09					
<i>Eusapromyza multipunctata</i> (Fallén, 1820)	Č II.					
<i>Homoneura biumbrata</i> (Loew, 1847)	Č II.					
<i>Homoneura notata</i> (Fallén, 1820)	Č II., S-K 09					
<i>Homoneura limnea</i> (Becker, 1895)	S-K 09					
<i>Homoneura dilecta</i> (Rondani, 1868)	S-K 09					
<i>Homoneura mediospinosa</i> Merz, 2003	S-K 09					
<i>Lyciella decempunctata</i> (Fallén, 1820)	S-K 09	8/2, 9/4,	7/2, 8/2,	5/1, 7/8, 8/1, 10/1	8/1,	9/2,
<i>Lyciella decipiens</i> (Loew, 1847)	Č II., S-K 09		6/1,			
<i>Lyciella pallidiventris</i> (Fallén, 1820)	Č II., S-K 09					
<i>Lyciella platycephala</i> (Loew, 1847)	Č II., S-K 09					
<i>Lyciella rorida</i> (Fallén, 1820)	Č II., S-K 09	5/1, 6/4, 8/5, 9/1, 10/5, 11/1,	5/3, 6/21, 7/4, 8/2, 10/1, 11/3,	5/6, 6/8, 7/14, 8/15, 9/1, 10/1,	5/4, 6/21, 7/21, 8/6, 9/5, 10/4, 11/1	7/1, 8/5, 9/3,
<i>Lyciella stylata</i> Papp, 1978	S-K 09					
<i>Minettia</i> (s.str.) <i>fasciata</i> (Fallén, 1826)	S-K 09					6/2,
<i>Minettia</i> (<i>Frendelia</i>) <i>longipennis</i> (Fabricius, 1794)	Č II., S-K 09					
<i>Minettia</i> (s.str.) <i>lupulina</i> (Fabricius, 1787)	Č II., S-K 09		6/1, 8/1,			
<i>Minettia</i> (s.str.) <i>rivosa</i> (Meigen, 1826)	Č II.					
<i>Minettia</i> (s.str.) <i>plumicornis</i> (Fallén, 1820)	S-K 09					
<i>Minettia</i> (s.str.) <i>subvittata</i> (Loew, 1848)	S-K 09					
<i>Peplomyza intermedia</i> E. Remm, 1979	Č II., S-K 09	8/2, 9/6,	5/1, 6/4, 7/1, 8/1,	5/4, 6/10, 7/9, 8/4, 9/1, 10/1,	6/1, 7/2, 8/2, 9/5, 10/3, 11/1,	8/1,
<i>Peplomyza litura</i> (Meigen, 1826)	Č II., S-K 09					
<i>Peplomyza discoidea</i> (Meigen, 1830)	S-K 09					
<i>Sapromyza</i> (s.str.) <i>apicalis</i> Loew, 1847	Č II., S-K 09	5/1, 6/2, 8/13, 9/20, 10/12, 11/6,	6/23, 7/1, 8/11, 10/6, 11/1,	5/21, 6/1, 7/50, 8/35, 9/1, 10/10, 11/20,	5/4, 6/6, 7/30, 8/11, 9/15, 10/20, 11/10,	5/2, 6/7, 7/3, 8/4, 9/3,
<i>Sapromyza</i> (<i>Schumannimyza</i>) <i>hyalinata</i> (Meigen, 1826)						

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Sapromyza</i> (s.str.) <i>obsolata</i> Fallén, 1820	Č II., S-K 09					
<i>Sapromyza</i> (s.str.) <i>palpella</i> Rondani, 1868	Č II., S-K 09				6/2,	
<i>Sapromyza</i> (s.str.) <i>pexpunctata</i> Meigen, 1826						
<i>Sapromyza</i> (s.str.) <i>intonsa</i> Loew, 1847	S-K 09					
<i>Sapromyza</i> (s.str.) <i>zetterstedti</i> Hendel, 1908	S-K 09					
<i>Sapromyzosoma quadricincta</i> (Becker, 1895)	S-K 09					
<i>Sapromyzosoma quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)	S-K 09					
<i>Tricholauxania praeusta</i> (Fallén, 1820)	Č II., S-K 09				5/1,	5/1,
Dryomyzidae						
<i>Dryomyza flaveola</i> (Fabricius, 1794)		3/3,		5/1, 11/2,	5/7, 9/3, 10/1, 11/2	
<i>Dryomyza anilis</i> Fallén, 1820				5/2, 6/1, 7/3,		
Phacomyiidae						
<i>Pelidnoptera fuscipennis</i> (Meigen, 1830)	R 93	8/1, 9/3,		6/5, 8/1, 9/2, 10/2		8/3, 9/1,
Sciomyzidae						
<i>Calobaea distincta</i> (Meigen, 1830)	R 93, 98	9/8,	8/1, 10/2,	8/10, 9/5, 10/6,	7/1,	8/3,
<i>Coremacera catenata</i> (Loew, 1847)				11/2,		
<i>Coremacera marginata</i> (Fabricius, 1775)	R 93	8/1,	7/1,	8/2,		9/1,
<i>Dichetophora oblitterata</i> (Fabricius, 1805)	R 93					
<i>Ditaeniella griseocens</i> (Meigen, 1830)	R 93					
<i>Elgiva cucularia</i> (Linnaeus, 1767)	R 93	8/1, 9/1,	3/17, 10/1,	3/3, 10/10, 11/18	4/18, 11/1,	7/2,
<i>Euthycera chaerophylli</i> (Fabricius, 1798)	R 93	9/1,		7/1,		
<i>Hydromya dorsalis</i> (Fabricius, 1775)	RR 63				5/7,	5/1,
<i>Ilione albiseta</i> (Scopoli, 1763)	R 93					
<i>Ilione lineata</i> (Fallén, 1820)	R 93					
<i>Limnia unguicornis</i> (Scopoli, 1763)	R 93	7/2,		7/1,		
<i>Pherbellia austera</i> (Meigen, 1830)	R 93			6/2,	5/2,	
<i>Pherbellia cinerella</i> (Fallén, 1820)	R 93					
<i>Pherbellia dorsata</i> (Zetterstedt, 1846)	R 93					
<i>Pherbellia griseola</i> (Fallén, 1820)	R 93					
<i>Pherbellia nana</i> (Fallén, 1820)	R 93					
<i>Pherbellia pallidiventris</i> (Fallén, 1820)	R 93					
<i>Pherbellia schoenherri</i> (Fallén, 1820)	R 93					9/1,
<i>Pherbellia scuellaris</i> (von Roser, 1840)						
<i>Psacadina zernyi</i> (Meier, 1820)	R 93		3/1,			
<i>Pteromicra leucopeza</i> (Meigen, 1838)	R 95, 98,					

Čel'ad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Renocera pallida</i> (Fallén, 1820)	R 93	5/1,	5/5, 6/3, 10/1, 11/1,	5/48,		5/2,
<i>Sciomyza dryomizina</i> Zetterstedt, 1846	R 93					
<i>Sciomyza simplex</i> Fallén, 1820	R 93					
<i>Sciomyza testacea</i> Macquart, 1835	R 93, 98					
<i>Sepedon sphegea</i> (Fabricius, 1775)	R 93					
<i>Sepedon spinipes</i> (Scopoli, 1763)	R 93					
<i>Tetanocera arrogans</i> Meigen, 1830)	R 93					
<i>Tetanocera elata</i> (Fabriciue, 1781)	R 93					5/1,
<i>Tetanocera ferruginea</i> Fallén, 1820	R 93					
<i>Tetanocera fuscinervis</i> (Zetterstedt, 1838	R 93			6/12,	6/1, 7/1,	
<i>Tetanopocera hyalipennis</i> Roser, 1840	R 93					
<i>Tetanocera montana</i> Day, 1881	R 93					
<i>Tetanocera sylvatica</i> Meigen, 1830	R 93					
<i>Trypetoptera punctulata</i> (Scopoli, 1763)	R 93	8/1, 9/3,	5/2, 6/1, 7/3, 8/7, 10/1,			7/1, 8/3,
Sepsidae						
<i>Nemopoda nitidula</i> (Fallén, 1820)		5/1, 6/1, 8/1,	5/3, 6/4, 7/2, 8/2,	8/1,	5/1, 8/2,	6/1,
<i>Sepsis fulgens</i> Hoffmannsegg in Meigen, 1826		5/2, 8/6,	5/2, 7/1, 10/2	7/1, 8/1,		5/1, 6/1,
<i>Sepsis punctum</i> (Fabricius, 1794)	Č II.	4/48, 6/2, 9/2,	3/4, 4/1, 5/2, 6/4, 7/1, 8/3, 11/1	8/3, 9/1,	7/2, 8/6,	7/1,
Clusiidae						
<i>Clusia flava</i> (Meigen, 1830)		8/1,		6/1,		
<i>Clustodes albimanus</i> (Meigen, 1830)					5/6	
<i>Clustodes caledonicus</i> (Collin, 1912)					5/2, 6/3,	
<i>Clustodes geomyzinus</i> (Fallén, 1823)						
<i>Clustodes ruficollis</i> (Meigen, 1830)						
<i>Paracclusia tigrina</i> (Fallén, 1820)					6/3, 7/1, 8/2,	8/1,
Agromyzidae						
<i>Liriomyza eupatorii</i> (Kaltenbach, 1873)						
<i>Metopomyza xanthaspis</i> (Loew, 1858)		5/1,	5/3,			
<i>Ophiomyia labiatarum</i> Hering, 1937		6/5,				
<i>Ophiomyia pulicaria</i> (Meigen, 1830)		4/1,				
<i>Phytomyza chaerophylli</i> Kaltenbach, 1856		4/1, 6/5,	5/11,		10/5,	
<i>Phytomyza lappae</i> Goureau, 1851						

Čeľad/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Phytomyza ranunculi</i> (Schränk, 1803)				4/1,		
<i>Phytomyza rufipes</i> Meigen, 1830			4/1,			
Opomyzidae						
<i>Geomyza balachowskyi</i> Mesnil, 1934	Č II.					
<i>Geomyza martineki</i> Drake, 1992	Č II.					
<i>Geomyza tripunctata</i> Fallén, 1823	Č II.	6/1, 9/1,	10/1,			
<i>Geomyza venusta</i> (Meigen, 1830)						
<i>Opomyza storum</i> (Fabricius, 1794)	Č II.					
<i>Opomyza germinationis</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Opomyza petrei</i> Mesnil, 1934	Č II.					
<i>Opomyza punctata</i> Haliday, 1833	Č II.					
<i>Opomyza punctella</i> Fallén, 1820		6/1, 8/1, 9/1, 10/3	6/1, 8/2, 8/2,	6/1, 8/2, 10/2, 11/1	7/12, 9/2, 10/2,	8/1,
Milichidae						
<i>Madiza glabra</i> Fallén, 1820						6/1,
Chloropidae						
<i>Cetema elongatum</i> (Meigen, 1830)						7/1,
<i>Camarota curvipennis</i> (Latreille, 1805)	Vz.		10/5,			
<i>Chlorops</i> (s.str.) <i>anthracophagoides</i> Strobl, 1901		4/1,				
<i>Chlorops</i> (s.str.) <i>hypostigma</i> Meigen, 1830		4/1, 5/6, 6/1,	5/1, 6/2, 8/1,			6/2, 8/2,
			10/6, 11/1,			
<i>Chlorops</i> (s.str.) <i>pumilionis</i> (Bjerkander, 1778)	Č II.	11/1,				
<i>Chlorops</i> (s.str.) <i>serenus</i> Loew, 1866			5/2, 10/3,			
<i>Elachiptera cornuta</i> (Fallén, 1820)		4/2,	4/1, 11/1,			
<i>Lasiambia palposa</i> (Fallén, 1820)		4/1,				
<i>Lipara lucens</i> Meigen, 1830					5/1,	6/1,
<i>Oscinella frit</i> (Linnaeus, 1758)		5/1,				5/2,
Heleomyzidae						
<i>Ecoptomera microps</i> (Meigen, 1830)	Č II.					
<i>Ecoptomera pallescens</i> (Meigen, 1830)	Č II.					
<i>Suillia affinis</i> (Meigen, 1830)	Č II.	3/3, 5/4, 8/1,	3/2, 4/11,	3/1, 4/13, 5/12,	4/2, 5/3, 6/7,	6/2, 7/5,
		10/1,	5/16, 6/4, 7/3,	6/14, 7/30, 8/12,	7/4, 8/3, 10/4,	8/6, 9/1,
			8/1, 10/1	9/2, 10/5, 11/2	11/1	
			5/3,			
<i>Suillia flava</i> (Meigen, 1830)				5/8,	6/3, 10/1,	6/1, 7/1, 8/5
<i>Suillia gigantea</i> (Meigen, 1830)					6/1,	
<i>Suillia lurida</i> (Meigen, 1830)						
<i>Suillia oldenbergii</i> (Czerny, 1904)			3/24, 4/7, 5/2	3/40,		

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Suillia pallida</i> (Fallén, 1820)	Č II.	3/1, 8/1,	5/4, 6/1, 8/2,	5/1, 6/2, 7/15, 8/1, 10/1,	5/2, 6/1, 7/3, 8/4,	7/1,
<i>Suillia variegata</i> (Loew, 1862)						
<i>Tephrochlamys rufiventris</i> (Meigen, 1830)	Č II.			8/2,		
Anthomyzidae						
<i>Anthomyza gracilis</i> Fallén, 1823				4/2,		
Trioxoscelididae						
<i>Trioxoscelis frontalis</i> (Fallén, 1823)		5/2,				
Sphaeroceridae						
<i>Coproica ferruginata</i> (Stenhammar, 1855)		4/1,				
<i>Copromyza stercoraria</i> (Meigen, 1830)		4/4, 6/1, 11/5,	4/1, 5/3,		5/4,	
<i>Crumomyia setitibialis</i> (Spuler, 1925)						
<i>Ischiolepta nitida</i> (Duda, 1920)		4/1,	5/3, 6/1, 4/1,	11/1,		5/2, 6/1,
<i>Leptocera</i> (s.str.) <i>fontinalis</i> (Fallén, 1826)	Č II.	4/1,				
<i>Leptocera</i> (<i>Rachispoda</i>) <i>hostica</i> Villeneuve, 1917						
<i>Leptocera</i> (<i>Rachispoda</i>) <i>limosa</i> (Fallén, 1820)	Č II.	4/5,				
<i>Sphaerocera curvipes</i> Latreille, 1805						
Drosophilidae						
<i>Chymomyza costata</i> (Zetterstedt, 1838)			5/1, 7/1, 10/1,		5/1, 6/1, 8/1, 6/2,	6/1,
<i>Chymomyza distincta</i> (Egger, 1862)			8/3, 10/2,	10/3,	11/1,	9/2,
<i>Drosophila</i> (<i>Sophophora</i>) <i>melanogaster</i> Meigen, 1830		8/1,		3/2, 5/1, 8/2, 11/2, 9/5, 10/5,	5/3, 6/1, 7/7, 8/3, 10/1,	5/1, 7/2, 8/3, 7/4,
<i>Drosophila</i> (s.str.) <i>phalerata</i> Meigen, 1830		3/1, 4/1, 5/2, 6/2,	5/5, 6/2, 8/2,			
<i>Leucophenga maculata</i> (Dufour, 1839)		8/1,	4/1, 7/2,	4/3, 6/1, 8/1,	8/1,	
<i>Oscinella frit</i> (Linnaeus, 1758)		4/1.				
<i>Scaptomyza</i> (s.str.) <i>graminum</i> (Fallén, 1823)				4/1,		
<i>Scaptomyza</i> (<i>Parascaptomyza</i>) <i>pallida</i> (Zetterstedt, 1847)		3/27, 4/3, 6/1,	5/5, 6/1, 10/1,	4/1,	6/2,	
<i>Stegana</i> (<i>Steganina</i>) <i>coleoptrata</i> (Scopoli, 1763)		6/2,	5/3, 6/2, 8/1,	5/1, 6/1, 10/1,		9/3,
<i>Stegana</i> (<i>Steganina</i>) <i>mehadysae</i> Duda, 1924				8/1, 9/1, 10/1,		
Diastatidae						
<i>Diastata nebulosa</i> (Fallén, 1823)			10/3,		5/1,	
Ephyridae						
<i>Parydra</i> (s.str.) <i>aquila</i> (Fallén, 1813)					4/1,	
Scatophagidae						
<i>Cordilura ciliata</i> (Meigen, 1826)		8/2,	6/1,			

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Cordilura pubera</i> (Linnaeus, 1758)		9/10,	10/1,		6/1, 7/1, 8/3,	
<i>Cordilura umbrosa</i> (Loew, 1873)	Č II.	8/2, 9/5,	8/1,	5/1,	5/1,	
<i>Norellisoma nervosum</i> (Meigen, 1826)		8/4,	5/1, 7/1	8/2,	4/1,	
<i>Norellisoma spinimanum</i> (Fallén, 1819)	Č II.	5/1, 6/2, 8/3, 9/1,	5/12, 6/3,	5/1, 7/3, 8/1,	5/6, 7/2, 8/3,	5/1, 6/3,
<i>Parallelomma albipes</i> (Fallén, 1819)			7/4, 10/5,	9/1, 10/3,	9/1, 10/1,	7/2, 9/3,
<i>Phrosia albilabris</i> (Fabricius, 1794)		4/5, 5/59, 6/7,	4/9, 5/6, 6/6,	4/6,		
		8/1,	7/2, 8/3,			
<i>Scathophaga lutaria</i> (Fabricius, 1794)		4/13, 5/4, 9/3,	3/6, 4/15, 5/10,	3/15, 4/11, 5/2,	4/38, 5/46, 6/2,	5/1,
		10/5, 11/1,	10/3, 11/2	6/6, 9/1, 11/5,	7/3, 8/2, 9/3, 10/3	
<i>Scatophaga stercoraria</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.	4/33, 8/2, 9/1, 11/1	4/1, 8/1,	4/2, 5/1, 7/1, 10/2	4/7, 5/4,	6/1,
<i>Trichopalpus fraternus</i> (Meigen, 1826)						
Anthomyiidae						
<i>Anthomyia monilis</i> (Meigen, 1826)			5/2, 6/22,	5/41,	6/21,	6/1,
<i>Anthomyia pluvialis</i> (Linnaeus, 1758)					5/7,	
<i>Anthomyia procellaris</i> Rondani, 1866		4/45, 5/73,				
<i>Botanophila brunneilinea</i> (Zetterstedt, 1845)	Č II.	10/30,	3/10, 4/33, 6/60	3/96, 5/4,	4/262, 6/65,	6/2, 10/5,
<i>Delia antiqua</i> (Meigen, 1826)		6/11,	5/26, 7/16,	6/6, 8/1,	6/1,	
<i>Delia cardui</i> (Meigen, 1826)		4/6,				
<i>Delia floricola</i> Robineau-Désvoidy, 1830	Č II.	4/16, 8/20,	4/21, 8/50,	4/31, 5/4, 8/25,	7/170, 8/45,	6/30, 7/25,
<i>Delia frontella</i> (Zetterstedt, 1838)	Č II.		10/80, 11/20,		11/15,	8/10,
<i>Delia platura</i> (Meigen, 1826)	Č II.				9/20, 11/5,	
					5/3,	5/1,
			5/5, 6/2,		5/3,	
		4/2,			5/1, 6/21,	
<i>Delia radicum</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.					
<i>Eustalomyia hilaris</i> (Fallén, 1823)		3/38, 5/1, 6/2,	5/2,	5/3, 6/6,	5/1, 6/1,	
<i>Heterostylodes pratensis</i> (Meigen, 1826)			6/3,			
<i>Hylemya nigrimana</i> (Meigen, 1826)			7/11,			
<i>Leucophora grisella</i> Hennig, 1967			4/1, 5/22,			
<i>Mycophaga testacea</i> (Gimmerthal, 1834)		5/21,	4/5, 5/26,	6/32, 7/55, 8/2,	5/12, 6/21,	5/2, 6/5,
<i>Pegomya calypttrata</i> (Zetterstedt, 1846)		4/45, 8/10, 9/50,	6/43, 7/10,		7/170, 8/30,	7/30, 8/25,
<i>Pegomya geniculata</i> (Bouché, 1834)		10/20,	8/50, 10/20,		10/35, 11/20,	9/10,
<i>Pegomya transversa</i> (Fallén, 1825)			11/20,			
<i>Phorbia sepia</i> (Meigen, 1826)						

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
Fanniidae						
<i>Fannia armata</i> (Meigen, 1826)	Č II.	8/1, 10/2,	6/1,	5/4,	5/32, 6/2,	6/1,
<i>Fannia canicularis</i> (Linnaeus, 1761)	Č II.			6/1,		
<i>Fannia lepida</i> (Wiedemann, 1817)		6/6,	6/2,	5/5,		
<i>Fannia lustrator</i> (Harris, 1780)		4/40,	5/52,			
<i>Fannia manicata</i> (Meigen, 1826)						
<i>Fannia polychaeta</i> (Stein, 1895)						
<i>Fannia vespertilionis</i> Ringdahl, 1934	1. nálež v SR!	8/1, 9/3, 10/5, 11/1	7/1, 8/6, 11/3	7/1, 8/4, 9/3, 11/5	9/5,	9/1,
Muscidae						
<i>Azela triquetra</i> (Wiedemann, 1817)		8/2,	7/1,			9/2,
<i>Coenosia atra</i> Meigen, 1830			5/1, 10/2,	7/1,	4/22,	
<i>Coenosia intermedia</i> (Fallén, 1825)		4/1, 5/4, 6/1, 8/5,	5/2, 7/2, 8/5,	4/1, 7/5, 8/6,	5/3, 9/2,	5/1, 7/2,
		9/3,		10/3, 11/1,		8/3, 9/1,
<i>Coenosia pygmaea</i> (Zetterstedt, 1845)			3/2, 4/16,			
<i>Coenosia tigrina</i> (Fabricius, 1775)			5/1,			
<i>Helina lasiophthalma</i> (Macquart, 1835)		8/1, 9/2, 10/2,	6/1, 7/2, 8/1,	6/9, 7/9, 8/3,	8/2,	
			10/6, 11/1,	9/3,		
<i>Musca autumnalis</i> De Geer, 1776		4/1, 8/1,			9/1,	9/2,
<i>Muscina stabulans</i> (Fallén, 1817)		3/18,				
<i>Myospila mediotabunda</i> (Fabricius, 1781)		5/1,		4/1, 6/14,	6/1,	5/2,
<i>Phaonia angelicae</i> (Scopoli, 1763)					5/2,	
<i>Phaonia bitincta</i> (Rondani, 1866)	STRAKA, MAJZLAN 2006 a	4/2, 9/8, 10/1,	4/2, 6/4, 8/1, 10/20,	4/3, 5/4, 6/1, 7/2, 8/4, 9/1, 10/10,	5/24, 6/1, 9/2, 10/2, 11/2,	6/1, 8/1,
		5/1,		5/1, 6/4,	6/1,	
		6/3,	7/1,	7/2,	4/1,	
<i>Phaonia errans</i> (Meigen, 1826)						
<i>Phaonia lugubris</i> (Meigen, 1826)		5/2,	5/3, 6/1, 10/10	6/3, 7/2, 11/80, 4/5, 8/1,	5/1, 6/2,	5/1, 6/1,
<i>Phaonia mystica</i> (Meigen, 1826)						
	STRAKA, MAJZLAN 2006 b					
<i>Phaonia pallida</i> (Fabricius, 1787)						
<i>Phaonia perdita</i> (Meigen, 1830)						
<i>Phaonia subventa</i> (Harris, 1780)					4/3,	
<i>Phaonia tuguriorum</i> (Scopoli, 1763)					5/14,	
<i>Phaonia valida</i> (Harris, 1780)		10/1, 11/1,	5/1, 7/5, 8/3, 10/50, 11/10,	7/5, 10/101,	4/1, 8/5, 10/6, 11/10,	6/1, 8/2, 9/2, 10/3,
<i>Phaonia zugmayeriae</i> (Schmabl, 1888)						

Čel'ad'/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Queracetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Pyrellia vivida</i> Robineau-Desvoidy, 1830		4/10, 5/2,	4/5, 5/12, 6/1	3/1, 4/1, 5/2, 7/30, 8/15,	4/1, 5/17, 6/7, 7/11, 8/15, 10/5,	7/10,
<i>Thricops diaphanus</i> (Wiedemann, 1817)		8/5, 9/7, 10/6,	8/6, 10/13, 11/7,	6/5, 7/27, 8/25, 9/5, 10/5, 11/7,	10/7, 11/5,	7/1,
<i>Thricops semicinereus</i> (Wiedemann, 1817)		7/5,	10/5,	10/5,	10/1,	
Calliphoridae						
<i>Calliphora vicina</i> Robineau-Désvoidy, 1830	Č II.	4/1, 8/10, 10/13, 11/12,	8/75, 10/20,	9/5, 10/40, 11/2,	7/10, 8/17, 9/10,	6/5, 7/30, 8/40, 9/10, 10/5,
<i>Calliphora vomitoria</i> (Linnaeus, 1758)			4/1,			
<i>Cynomya mortuorum</i> (Linnaeus, 1761)	Č II.	6/1, 8/5, 9/20, 11/2,	4/1, 5/1, 6/4, 7/12, 8/13, 10/7	7/7, 8/3, 10/2, 11/1,	6/1, 7/3, 8/3, 11/1,	6/1, 7/5, 8/8, 9/1, 5/1, 5/4,
<i>Lucilia caesar</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.	6/4,	5/1,	5/2, 6/3,		
<i>Lucilia silvarum</i> (Meigen, 1826)	Č II.					
<i>Onestia floralis</i> Robineau-Desvoidy, 1830	Č II.					
<i>Pollenia amentaria</i> (Scopoli, 1763)	Č II.	3/12, 4/37,	3/31, 4/64, 10/10, 11/13,	3/46, 4/37,	4/166, 5/23,	
<i>Pollenia rudis</i> (Fabricius, 1794)	Č II.					
<i>Pollenia vitatica</i> Robineau-Désvoidy, 1830	Č II.					
Rhinophoridae						
<i>Melanophora roralis</i> (Linnaeus, 1758)			7/1, 8/2,	6/2,		7/3,
Sarcophagidae						
<i>Helicophagella</i> (s.str.) <i>crassimargo</i> (Pandellé, 1896)	Č II.		8/6,	7/12, 10/3, 7/5, 8/6,	7/1,	7/3,
<i>Helicophagella</i> (<i>Parabellieria</i>) <i>melanura</i> (Meigen, 1826)	Č II.					
<i>Helicophagella</i> (s.str.) <i>noverca</i> (Rondani, 1860)	Č II.		5/2,	7/30, 8/14,		5/3, 8/8,
<i>Helicophagella</i> (s.str.) <i>rosellei</i> (Boettcher, 1912)	Č II.		8/4,	7/23,		
<i>Heteronychia</i> (s.str.) <i>haemorrhoea</i> (Meigen, 1826)	Č II.		7/2,	5/2, 7/21, 8/5, 7/26,	6/2, 8/2,	7/5,
<i>Heteronychia</i> (s.str.) <i>hirticus</i> (Pandellé, 1896)	Č II.		6/2,	6/5, 7/3,		
<i>Heteronychia</i> (s.str.) <i>schineri</i> (Bezzi, 1891)	Č II.					
<i>Metopia argyrocephala</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Pandelleana protuberans</i> (Pandellé, 1896)	Č II.					
<i>Parasarcophaga emdeni</i> Rohdendorf, 1970	Č II.					
<i>Parasarcophaga harpax</i> (Pandellé, 1896)	Č II.	9/4,	7/2,	8/1,	6/2, 7/6,	6/5, 8/4,
<i>Parasarcophaga jacobsoni</i> Rohdendorf, 1937	Č II.					
<i>Parasarcophaga similis</i> (Meade, 1876)	Č II.	5/5,		6/5,		
<i>Parasarcophaga tuberosa</i> (Pandellé, 1896)	Č II.					

Čeľad/druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Pierretia</i> (s.str.) <i>nigriventris</i> (Meigen, 1826)		8/9,	5/12,	7/22, 8/15,	5/2,	5/2, 6/12, 7/10, 8/5,
<i>Pierretia</i> (s.str.) <i>soror</i> (Rondani, 1860)			8/10,	7/18,		5/1,
<i>Ravinia pernix</i> (Harris, 1780)		5/3,	5/2,	4/1,	8/2,	5/1, 7/3, 8/6
<i>Robineauella scoparia</i> (Pandellé, 1896)	Č II.		7/2,			
<i>Rosellea aratrix</i> (Pandellé, 1896)	Č II.		4/2, 5/21, 6/7,	5/7, 6/14, 8/4,	4/2, 5/2, 6/3,	5/4, 6/10,
<i>Sarcophaga carnaria</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.	4/1, 5/5, 6/17, 9/2,	7/11, 8/15	9/5,	7/1, 8/2,	7/12, 8/4, 9/5
<i>Thyrococnema incisilobata</i> Pandellé, 1896	Č II.		5/1,	7/16,		
Tachinidae						
<i>Acemyia acuticornis</i> (Meigen, 1824)	Č II.	5/21,		10/1,	6/1,	5/1, 8/5,
<i>Actia infantula</i> (Zetterstedt, 1844)						
<i>Actia pilipennis</i> (Fallén, 1810)	Vz.					
<i>Aylostoma tricolor</i> (Mik, 1884)	Č II.					
<i>Bessa parallela</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Bithia glirina</i> (Rondani, 1861)	Č II.					
<i>Bithia spreta</i> (Meigen, 1824)	Vz.	4/1,		3/2, 4/2,		
<i>Blepharomyia pagana</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Blondelia nigripes</i> (Fallén, 1810)	Č II.					
<i>Carcelia bombylans</i> Robineau-Désvoidy, 1830	Č II.					
<i>Carcelia lucorum</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Ceromya flavipes</i> (Ratzeburg, 1844)	Č II.					
<i>Ceranthia abdominalis</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)	Č II.		5/1, 6/1, 8/1, 4/1,			
<i>Chetogena fasciata</i> (Egger, 1856)	Č II.	4/1,			7/1,	9/1, 7/1, 8/7, 7/1, 8/2,
<i>Chrysosomopsis auratus</i> (Fallén, 1820)						
<i>Cistogaster globosa</i> (Fabricius, 1775)						
<i>Clytiomya continua</i> (Panzer, 1798)						
<i>Cylindromyia auriceps</i> (Meigen, 1838)	Č II.		7/1,			
<i>Cylindromyia brassicaria</i> (Fabricius, 1775)	Č II.	8/6, 9/3,	7/2, 8/1, 10/1	7/1,	8/1,	
<i>Cylindromyia interrupta</i> (Meigen, 1824)	Č II.		7/1,			
<i>Cylindromyia xylofina</i> (Egger, 1860)	Č II.	8/4,				
<i>Dexia rustica</i> (Fabricius, 1775)	Č II.					
<i>Dinera ferrina</i> (Fallén, 1816)	Č II.					
<i>Drino vicina</i> (Zetterstedt, 1849)	Č II.					
<i>Dufouria chalybeata</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Ectophasia crassipennis</i> (Fabricius, 1794)	Č II.					

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Eliozeta pellucens</i> (Fallén, 1820)	Č II.					
<i>Elodia morio</i> (Fallén, 1820)	Č II.		5/3,			
<i>Elomya latealis</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Eriothrix argyreata</i> (Meigen, 1824)	Č II.	8/6, 9/3,				7/1, 8/1,
<i>Eriothrix rufomaculata</i> (De Geer, 1776)	Č II.					
<i>Ernestia puparum</i> (Fabricius, 1794)	Č II.					
<i>Erycia fatua</i> (Meigen, 1824)	Č II.	4/6,	5/3,	4/1,		
<i>Erythroceera nigripes</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)	Č II.					
<i>Exorista fasciata</i> (Fallén, 1820)	Č II.					
<i>Exorista larvarum</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.		7/1,			
<i>Exorista rustica</i> (Fallén, 1810)	Č II.					
<i>Exorista tubulosa</i> Herting, 1967	Č II.					
<i>Eurithia consobrina</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Gonia divisa</i> Meigen, 1826	Č II.					
<i>Gonia foersteri</i> Meigen, 1838	Č II.		4/3,			
<i>Gonia picea</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)	Č II.					
<i>Gonia vacua</i> Meigen, 1826	Č II.	4/6, 5/2,	4/30, 5/6,	4/17, 5/4,	5/1,	5/1,
<i>Gymnosoma nitens</i> Meigen, 1824	Č II.	5/21, 6/1,				
<i>Gymnosoma rotundatum</i> (Linnaeus, 1758)	Č II.	8/1, 9/2,				9/1,
<i>Hebia flavipes</i> Robineau-Desvoidy, 1830	Č II.	6/1,				
<i>Hemida obscuripennis</i> (Meigen, 1824)	Č II.	6/1,				
<i>Huebneria affinis</i> (Fallén, 1810)	Č II.					
<i>Istochna cinerea</i> (Macquart, 1850)	Č II.					
<i>Leiophora innoxia</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Leucostoma anthracina</i> (Meigen, 1824)	Č II., Vz.					
<i>Ligeria angusticornis</i> (Loew, 1847)	Č II.					
<i>Ligeriella aristata</i> (Villeneuve, 1911)	Č II.					
<i>Linnaemyia picta</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Lydella griseocens</i> Robineau-Desvoidy, 1830	Č II.					
<i>Lydella stabulans</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Macquartia dispar</i> (Fallén, 1820)	Č II.					
<i>Macquartia tenebricosa</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Medina collaris</i> (Fallén, 1820)	Č II.	8/1,				
<i>Medina luctuosa</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Meigenia mutabilis</i> (Fallén, 1810)	Č II.					
<i>Nemoraea pellucida</i> (Meigen, 1824)	Č II.		6/1,			

Čeľad' druh	Pozn., Lit. ú.	Mokrad'	Slanisko	Quercetum	Alnetum	Biol. st.
<i>Nemorilla floralis</i> (Fallén, 1810)	Č II.					
<i>Opesia cana</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Paratryphera barbatula</i> (Rondani, 1859)	Č II.					
<i>Peleteria rubescens</i> (Robineau-Désvoidy, 1830)	Č II.					
<i>Peleteria varia</i> (Fabricius, 1794)	Č II.			6/1, 7/41, 9/1, 8/2,	7/100,	
<i>Phania curvicauda</i> (Fallén, 1820)						
<i>Weberia thoracica</i> Meigen, 1824						
<i>Phasia aurulans</i> Meigen, 1824						
<i>Phasia hemiptera</i> (Fabricius, 1794)	Č II.		8/1,			
<i>Phasia obesa</i> (Fabricius, 1794)	Č II.					
<i>Phasia subcoalepirata</i> (Linnaeus, 1767)	Č II.					
<i>Phebellia nigripalpis</i> (Robineau-Désvoidy, 1847)	Č II.					
<i>Phorinia aurifrons</i> Robineau-Désvoidy, 1830						
<i>Phorocera assimilis</i> (Fallén, 1810)						5/1, 6/2,
<i>Phorocera grandis</i> (Rondani, 1859)		5/2,		4/1, 5/1, 6/1,		
<i>Phryxe vulgaris</i> (Fallén, 1810)	Č II.					
<i>Platynya fimbriata</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Pseudogonia parisiaca</i> (Robineau-Désvoidy, 1851)	Č II.					
<i>Rhaphiochaeta breviseta</i> (Zetterstedt, 1836)	Č II., Vz.					
<i>Siphona geniculata</i> (De Geer, 1776)		5/1, 8/4,				
<i>Smidtia conspersa</i> (Meigen, 1824)	Č II.		4/1, 6/10, 7/7	8/1,	4/1, 8/5,	6/1, 8/2,
<i>Solieria pacifica</i> (Meigen, 1824)	Č II.		4/3,			
<i>Spallanzania hebes</i> (Fallén, 1820)	Č II.					
<i>Tachina fera</i> (Linnaeus, 1761)	Č II.					
<i>Tachina magnicornis</i> (Zetterstedt, 1844)	Č II.					
<i>Tachina ursina</i> (Meigen, 1824)						
<i>Thelaira nigripes</i> (Fabricius, 1794)	Č II.					
<i>Voria ruralis</i> (Fallén, 1810)	Č II.					
<i>Winthemia quadripustulata</i> (Fabricius, 1794)	Č II.					
<i>Winthemia variegata</i> (Meigen, 1824)	Č II.					
<i>Zenillia dolosa</i> (Meigen, 1824)		4/1,				
<i>Zeuxia brevicornis</i> (Egger, 1860)	Č II.					
<i>Zeuxia cinerea</i> Meigen, 1826	Č II.					
Spolu: 993 sp., 73 f.	487 sp., 31 f.	322 sp.	365 sp.	329 sp.	342 sp.	301 sp.

Vysvetlivky: Č – Čepelák; K – Kozánek; R – Roller; RR – Rozkošný; V – Vahhara; S-K – Semelbauer, Kozánek; S-R – Slovák, Roller.